

**MORTALIDAD PERINATAL E INFANTIL
EN LA REGIÓN DE MURCIA
1980-1997**

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo
Consejería de Economía y Hacienda

**La información contenida en esta publicación
puede consultarse en las direcciones de Internet:**

<http://www.carm.es/econet/>

<http://www.carm.es/csan/dgs/se/se.htm>

**Esta publicación también está disponible en
soporte informático**

Editan: Consejería de Sanidad y Consumo
Consejería de Economía y Hacienda

Elaboran: Dirección General de Salud Pública
Servicio de Epidemiología
Ronda de Levante, 11
30008 Murcia
Telf. 968 362039
Fax. 968 366656
mortmu@carm.es

Dirección General de Economía y Estadística
Centro Regional de Estadística
Teniente Flomesta, s/n
30003 Murcia
Telf. 968 362050 - 968 362054
Fax. 968 366397
sicrem@carm.es

Imprime:

I.S.B.N.: 84-95393-25-5

Depósito Legal:

Equipo de trabajo:

Dirección: Carmen Navarro Sánchez, Olalla Cruz Mata
Autores: Lluís Cirera Suárez, José García Rodríguez
Colaboradores: Consuelo Martínez López, Josefa Contreras Gil
Informática: Fuensanta Bernal Torrecillas
Fotocomposición: Luis Carlos Callejo Fuertes

PRESENTACIÓN

Con la presente monografía sobre las causas y tendencias de la mortalidad infantil y perinatal en nuestra Región, inauguramos una nueva serie documental de temas estadísticos. Queremos poder profundizar en el hecho demográfico y sanitario de las defunciones, describiéndolas según determinados parámetros de conocida importancia, como son, los rangos de edad, los periodos temporales, o las demarcaciones geográficas de nuestra Comunidad.

Así en este primer volumen informamos de las principales causas de muerte que afectan a las edades infantil y perinatal, abarcando un horizonte temporal amplio, con los dieciocho últimos años disponibles.

Esperamos y confiamos que con su difusión de este ejemplar, tanto en forma convencional en soporte papel como con la actual tecnología web, facilitaremos su acceso, disponibilidad y consulta a todo tipo de público potencial. Deseamos que esta información tenga especial interés y utilidad, para nuestros profesionales sanitarios en la atención obstétrica y pediátrica.

Son de obligada mención todos aquellos profesionales de la administración autonómica y estatal en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que de una u otra forma, con su labor, hacen posible la edición de este volumen, y nos participan a todos de su lectura.

JUAN BERNAL ROLDÁN
Consejero de Economía y Hacienda

FRANCISCO MARQUÉS SÁNCHEZ
Consejero de Sanidad y Consumo

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN.....	9
ABSTRACT.....	11
INTRODUCCIÓN.....	13
MATERIAL Y MÉTODOS.....	15
PRINCIPALES RESULTADOS	17
1. MORTALIDAD PERINATAL.....	17
2. MORTALIDAD INFANTIL	19
DISCUSIÓN.....	23
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN.....	26
BIBLIOGRAFÍA.....	27
TABLAS	29
1.- REGIÓN DE MURCIA. TENDENCIAS MORTALIDAD INFANTIL	29
1.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	31
1.2. Ídem. Niños.....	31
1.3. Ídem. Niñas.....	32
1.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	33
1.5. Ídem. Niños.....	33
1.6. Ídem. Niñas.....	33
1.7. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	34
1.8. Ídem. Niños.....	37
1.9. Ídem. Niñas.....	40
2.- REGIÓN DE MURCIA. TENDENCIAS MORTALIDAD PERINATAL.....	43
2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal por sexo. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)	45
2.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal por sexo. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)	45
2.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	46
2.4. Ídem. Niños.....	49
2.5. Ídem. Niñas.....	52
3.- ÁREAS DE SALUD. TENDENCIAS MORTALIDAD INFANTIL	55
3.1.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	57
3.1.2. Ídem. Área de salud II.....	57
3.1.3. Ídem. Área de salud III.....	58

3.1.4. Ídem. Área de salud IV	58
3.1.5. Ídem. Área de salud V	59
3.1.6. Ídem. Área de salud VI	59
3.2.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	60
3.2.2. Ídem. Área de salud II.....	60
3.2.3. Ídem. Área de salud III.....	60
3.2.4. Ídem. Área de salud IV	61
3.2.5. Ídem. Área de salud V	61
3.2.6. Ídem. Área de salud VI	61
3.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	62
3.3.2. Ídem. Área de salud II.....	65
3.3.3. Ídem. Área de salud III.....	68
3.3.4. Ídem. Área de salud IV	71
3.3.5. Ídem. Área de salud V	74
3.3.6. Ídem. Área de salud VI	77
4.- ÁREAS DE SALUD. TENDENCIAS MORTALIDAD PERINATAL.....	81
4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal por área de salud. Ambos sexos (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	83
4.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal por área de salud. Ambos sexos (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)	83
4.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	84
4.3.2. Ídem. Área de salud II.....	87
4.3.3. Ídem. Área de salud III.....	90
4.3.4. Ídem. Área de salud IV	93
4.3.5. Ídem. Área de salud V	96
4.3.6. Ídem. Área de salud VI	99
5.- REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 1993-1997.....	103
5.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	105
5.2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	105
5.3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)	105
5.4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)	106
5.5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)	106
5.6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	107
5.7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	107
6.- ÁREAS DE SALUD. PERIODO 1993-1997.....	109
6.1.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos).....	111
6.1.2. Ídem. Área de salud II.....	111
6.1.3. Ídem. Área de salud III.....	111
6.1.4. Ídem. Área de salud IV	112
6.1.5. Ídem. Área de salud V	112
6.1.6. Ídem. Área de salud VI	112

6.2.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos. Área de salud I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos).....	113
6.2.2. Ídem. Área de salud II.....	113
6.2.3. Ídem. Área de salud III.....	113
6.2.4. Ídem. Área de salud IV	114
6.2.5. Ídem. Área de salud V.....	114
6.2.6. Ídem. Área de salud VI	114

GRÁFICAS..... 115

1. Evolución de las tasas de mortalidad perinatal por trienios y sexo. Región de Murcia. 1980-1997	117
2. Evolución de las tasas de las principales causas de mortalidad perinatal por trienios. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997	117
3. Evolución de las tasas de mortalidad perinatal por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997	118
4. Evolución de las tasas de enfermedades perinatales por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997	118
5. Evolución de las tasas de anomalías congénitas por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997	119
6. Distribución (%) de la mortalidad perinatal por causas. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997	119
7. Distribución (%) de la mortalidad fetal tardía por causas. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997	120
8. Evolución de las tasas de la mortalidad infantil, neonatal y posneonatal por trienios. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997	120
9. Evolución de las tasas de mortalidad infantil por sexo y trienios. Región de Murcia. 1980-1997	121
10. Evolución en el porcentaje de muertes infantiles causadas por anomalías congénitas y por afecciones originadas en el período perinatal. Ambos sexos. Región de Murcia 1980-1997	121
11. Evolución de las tasas de mortalidad infantil por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997	122
12. Evolución de las tasas de mortalidad infantil en la Región de Murcia y España por trienios. Ambos sexos. 1980-1997	122

ANEXOS 123

1. Nacimientos por área de salud y tipo de nacido, por trienios. Ambos sexos. 1980-1997	125
2. Nacimientos por área de salud y tipo de nacido. Ambos sexos. Periodo 1993-1997.	126
3. Defunciones de menores de un año por áreas de salud y edad, por trienios. Ambos sexos. 1980-1997	127
4. Defunciones de menores de un año por edad y área de salud. Ambos sexos. Periodo 1993-1997	128
5. Lista de códigos y de causas de muerte	129
6. Boletín estadístico de defunción	133
7. Boletín estadístico de partos, nacimientos y abortos	135
8. Áreas sanitarias y municipios	139
9. Comparación de la mortalidad perinatal del hospital materno infantil de la Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca" de Murcia y la estadística oficial.....	140

RESUMEN

La mortalidad infantil está considerada como uno de los principales indicadores de calidad de los servicios sanitarios y del nivel socioeconómico de una comunidad. Entre los factores que influyen en la mortalidad infantil, se observa que la mortalidad neonatal está más relacionada con la atención sanitaria a la mujer gestante y los cuidados neonatales, mientras que la mortalidad posneonatal está más relacionada con causas exógenas, como el entorno socioeconómico del recién nacido y las medidas de salud pública.

La mortalidad infantil en España, al igual que en el resto de los países desarrollados, ha experimentado un extraordinario descenso a lo largo de este siglo. La reducción de la mortalidad infantil ha sido más intensa en el periodo neonatal que en el posneonatal.

“En 1975, la tasa de mortalidad infantil regional era de 23,4 niños/as por mil nacidos vivos, superior a la de España (18,9 por mil nacidos vivos). Las mayores disminuciones en el periodo 1975-90, se dieron en los niños y en el periodo neonatal, sobre todo en la etapa neonatal precoz. En España y en un periodo similar (1975-88), la tendencia era descendente, más marcada en las muertes neonatales precoces (4,6% anual), y con una mortalidad posneonatal que tendía al aumento en las causas de origen perinatal (de 0,07 en el trienio 1975-1977 a 0,15 por mil nacidos vivos en 1986-1988)”.

En la monografía pretendemos describir las tendencias de la mortalidad infantil y sus tipos, entre los años 1980 y 1997, en la Región de Murcia y sus áreas sanitarias, y presentar las principales causas de muerte.

La fuente de datos ha sido el Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística a partir de la información de los Boletines Estadísticos de Defunción (para los fallecidos con más de 24 horas de vida) y los Boletines Estadísticos de Parto, Nacimientos y Abortos (fetos muertos de más de 180 días de gestación y nacidos vivos muertos antes de cumplir sus 24 horas de existencia). Hemos utilizado un listado de causas de muerte de elaboración propia, en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, según el criterio de magnitud.

En la Región de Murcia disminuyen las muertes perinatales desde 1980 con 254 decesos (tasa de 13,87 por mil nacidos vivos), y una cota mínima de 84 casos y una tasa de 6,27 por mil nacidos vivos en 1993. La disminución se produce sobretodo en el sexo masculino. Las principales grandes causas son las *afecciones del periodo perinatal* y las *anomalías congénitas*, ambas con tendencia descendente. En todos los trienios la frecuencia es mayor para las *afecciones perinatales* que para las *anomalías congénitas*, siendo las primeras el 78,5% de todas las muertes perinatales frente al 18,6% de las segundas en todo el periodo 1980-97. Sin embargo en la mortalidad infantil la distribución es distinta; 29,2% para las *anomalías congénitas* y 40,2% para las *afecciones perinatales*.

La mortalidad regional infantil ha pasado de una tasa de 14,4 muertes por mil nacidos vivos en 1980 a una tasa de 6,61 en 1997. Los niños han pasado de tener una mortalidad infantil de 15,82 en 1980 a una tasa de 6,31 en 1997. Las niñas han experimentado un menor descenso, pasando de 12,93 a 6,01. Se han producido descensos importantes en las etapas que componen la mortalidad infantil. Así, la mortalidad neonatal ha pasado de 9,50 en 1980 a 3,93 en 1997, mientras que la mor-

alidad posneonatal ha descendido de una tasa de 4,94 a 2,23. Todo ello sin que exista un traslado de las tasas de mortalidad neonatal (precoz o tardía) a la posneonatal a lo largo del tiempo, ni en niños ni en las niñas.

En la mortalidad infantil de estos 18 años estudiados, se aprecia un descenso importante en todos los grandes grupos de causas, experimentando un mayor descenso los traumatismos y envenenamientos (81,5%), las enfermedades infecciosas (75,6%) y las enfermedades del aparato respiratorio (76,9%) y menor en las anomalías congénitas (25,8%). Las únicas causas específicas que no han descendido son las anomalías congénitas múltiples y las anomalías cromosómicas.

El área sanitaria de Murcia presentaba al inicio del periodo, las tasas de mortalidad infantil más elevadas de la región (14,80 muertes por mil nacidos vivos en 1980-1982), sobre todo por una tasa de mortalidad neonatal muy elevada. El descenso experimentado es importante tanto en la mortalidad neonatal (57,0%), como en la mortalidad posneonatal (61,9%).

El área de salud de Cartagena partía con una tasa de mortalidad infantil parecida a la regional (11,45), y experimenta un notable descenso (49,1%), en especialmente por las muertes neonatales (57,3%).

Las tasas de mortalidad infantil del área de salud de Lorca presentan valores similares a los regionales.

El área del Noroeste registra en el primer y último trienio valores de las tasas mortalidad infantil inferiores a la media regional.

En el área sanitaria del Altiplano, por el contrario, se observan las tasas de mortalidad infantil más elevadas de la región. Aún así, han descendido de forma apreciable en sus tasas (37,0% en las tasas de mortalidad infantil y 61,5% en la posneonatal, aunque insuficiente en la mortalidad neonatal (7,6%).

El área de la Vega del Segura-Comarca Oriental, presenta la tasa de mortalidad infantil del primer trienio por debajo de la media regional (5,60), siendo la única área en la que ha aumentado (un 32,0%), hasta alcanzar una tasa de 7,4 en el último trienio, a expensas de la mortalidad neonatal (53,7%), y de la posneonatal (un 4,9%).

ABSTRACT

Infant mortality is regarded as one of the main indicators of the quality of the health care services and socio-economic level of a community. As for the factors that influence infant mortality, it is seen that newborn mortality is related more to the health care of expectant mothers and newborn infants, whereas post-neonatal mortality is related more to exogenous causes such as the socio-economic environment of the newborn infant and public health measures.

Infant mortality in Spain, as in other developed countries, has witnessed a substantial decline throughout this century. The reduction in infant mortality is greater in the neonatal than post-neonatal period.

In 1975, the infant mortality rate in the Murcia Region was 23.4 children per 1,000 live births, somewhat above the Spanish national average (18.9 per 1,000 live births). The greatest declines in the 1975-90 period occurred in infants in the neonatal period, especially in the early neonatal stage. In Spain and over a similar period (1975-88) the trend was downward, more markedly in early neonatal deaths (4.6% annually), and with post-neonatal mortality tending to be more the result of causes of a perinatal origin (from 0.07 in the three-year period 1975-1977 to 0.15 per 1,000 live births in the 1986-1988 period).

The aim of this paper is to report the trends and types of infant mortality in the Murcia Region and its health care areas between 1980 and 1997 and to present the main causes of death.

The source of data is the Natural Population Movement of the National Institute of Statistics taken from information in the Statistical Death Registries (for infants dying after 24 hours of life) and Statistical Parturition Registries, Births and Miscarriages (dead foetuses of over 180 days' gestation and live-born infants dying in the first 24 hours of life). We used our own list of causes of death, adapted from the International Classification of Diseases, according to criteria of magnitude.

Perinatal deaths have declined in the Murcia Region since 1980, with 254 deaths (rate of 13.87 per 1,000 live births); a minimum of 84 cases was recorded i.e. a rate of 6.27 per 1,000 live births in 1993. This decline has been observed particularly in males. The major causes are conditions in the perinatal period and congenital abnormalities, both showing a downward trend. In all the three-year periods the frequency is greater for perinatal conditions than for congenital abnormalities, the former accounting for 78.5% of all perinatal deaths throughout the 1980-97 period, compared to 18.6% for the latter. However, the ratio in infant mortality is different: 29.2% for congenital abnormalities and 40.2% for perinatal conditions.

Regional infant mortality dropped from 14.4 deaths per 1,000 live births in 1980 to 6.61 in 1997. Boys went from an infant mortality of 15.82% in 1980 to 6.31 in 1997. The decrease in girls was less, going from 12.93 to 6.01. Substantial declines occurred in the stages into which infant mortality is divided. Neonatal mortality went from 9.5 in 1980 to 3.93 in 1997, whereas post-neonatal mortality dropped from 4.94 to 2.23, without the rates of neonatal mortality (early or late) being reflected in the course of time in post-neonatal mortality, in either boys or girls.

Over this 18-year study period of infant mortality a substantial decline was observed in all the major groups of causes, more so in traumatism and poisoning (81.5%), infectious disease (75.6%) and respiratory diseases (76.9%) and less so in congenital abnormalities (25.8%). The only specific causes that have not declined are multiple congenital abnormalities and chromosomal abnormalities.

The Murcia health care area at the beginning of the period revealed the highest rates of infant mortality in the region (14.8 deaths per 1,000 live births in 1980-1982), due particularly to a very high rate of neonatal mortality. The decrease observed is considerable in both neonatal mortality (57.0%) and post-neonatal mortality (61.9%).

The Cartagena health care area began with a similar infant mortality rate to that of the region (11.45) and experienced a considerable decline (49.1%), especially in neonatal deaths (57.3%).

The infant mortality rates in the Lorca health care area show similar values to those of the region.

The North-West area in the first and last three-year periods has lower infant mortality rates than the regional average.

Conversely, the Altiplano health care area reveals the highest rates of infant mortality in the region. Even so, the rates have fallen considerably (37.0% in the infant mortality rates and 61.5% in post-neonatal mortality, although an insufficient 7.6% in neonatal mortality).

The Segura Plain-Eastern Region area in the first three-year period presents an infant mortality rate below the regional average (5.60) and is the only area in which the rate has increased (32.0%), reaching 7.4 in the last period as a result of neonatal (+53.7%) and post-neonatal 4.9% mortalities.

INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil (MI) está considerada como uno de los indicadores sanitarios y de nivel socioeconómico más valiosos para una comunidad, siendo utilizado asimismo como indicador de la calidad de los servicios sanitarios. La mortalidad infantil se refiere a los niños nacidos vivos y que fallecen antes de cumplir 1 año de edad, pudiéndose dividir, para facilitar su estudio, en dos periodos: la mortalidad neonatal -que considera las defunciones de niños de menos de 28 días-, y la mortalidad posneonatal, que engloba aquellas defunciones ocurridas en niños de 28 o más días de vida y con menos de 1 año de edad.

En cuanto a los factores que influyen en la mortalidad infantil, se observa que la mortalidad neonatal está más relacionada con la calidad de la atención recibida por la mujer gestante y con el cuidado neonatal. La mortalidad neonatal, a su vez, se compone de la mortalidad neonatal precoz (defunciones ocurridas en niños con menos de 7 días de vida) y la mortalidad neonatal tardía (defunciones ocurridas en niños con más de 6 y menos de 28 días de vida). La mortalidad posneonatal está más relacionada con el entorno socioeconómico del recién nacido.

La mortalidad infantil en España, al igual que en el resto de los países desarrollados, ha experimentado un extraordinario descenso a lo largo de este siglo, de forma que si en 1900 la tasa de mortalidad infantil (TMI) era de 204 por mil nacidos vivos, en 1997 fue de 5 defunciones por mil nacidos vivos. Esto supone que mientras que a comienzos de siglo 1 de cada 5 niños nacidos vivos en España moría antes de cumplir 1 año, actualmente sólo fallece 1 de cada 200 niños.

Este descenso ha sido consecuencia del importante progreso socioeconómico alcanzado por los países más desarrollados. Se ha observado que la reducción de la mortalidad infantil lograda durante este periodo ha sido más intensa en el periodo posneonatal que en el neonatal, lo cual puede ser explicado porque la mortalidad posneonatal es más sensible a las mejoras en el nivel de renta y a medidas de salud pública, por estar originada con mayor frecuencia, como ya se comentó previamente, por causas exógenas, que la mortalidad neonatal.

En dos estudios previos anteriores^{1,2}, se describe la evolución regional de la TMI y sus principales causas de muerte. En 1975, la TMI regional era de 23,4 niños/as por mil nacidos vivos, superior a la de España que era de 18,9 por mil nacidos vivos. En 1977 se equiparan las tasas, para pasar a tener Murcia, cifras menores hasta 1980. De 1975 a 1990 la mortalidad neonatal y la posneonatal representaban el 63,2% y 36,8%, respectivamente, de la mortalidad infantil; y la fetal tardía y la neonatal precoz el 47,3% y 52,7%, respectivamente, de la mortalidad perinatal. Las mayores disminuciones de la mortalidad se dieron en los niños y en el periodo neonatal, sobre todo en la etapa neonatal precoz. En un periodo similar (1975-88) y para todo el Estado³, la tendencia es descendente y mayor en las muertes neonatales precoces (4,6% anual). También destaca que en la mortalidad posneonatal, tienden al aumento las causas de origen perinatal (0,07 en 1975-77 a 0,15 por mil nacidos vivos en 1986-88).

Así en 1980, las tres primeras causas regionales de MI eran superponibles a las de España, y eran, por orden de magnitud, las causas originadas en el periodo perinatal, las anomalías congénitas y las enfermedades del aparato respiratorio, ocupando Murcia una tasa media baja para los tipos

de MI, entre el promedio y las CCAA con peores indicadores.

Esta monografía pretende estudiar las tendencias que ha seguido la mortalidad infantil globalmente y en los distintos periodos en que puede ser dividida (neonatal y posneonatal), entre los años 1980 y 1997 en la Región de Murcia, y determinar cuáles han sido las principales causas de muerte. También intentaremos comprobar si esta evolución ha sido uniforme en las distintas áreas sanitarias que integran la región y hasta qué punto ha sido la tendencia observada en la región similar a la seguida en las otras comunidades de España.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las fuentes de datos utilizadas en esta publicación han sido:

- Para las defunciones, la información procedente de los Boletines Estadísticos de Defunción (para los niños fallecidos con más de 24 horas de vida) y los Boletines Estadísticos de Parto, Nacimiento y Aborto (documento que ha de cumplimentarse en todos los fetos con más de 180 días de gestación y que sirve también como boletín de defunción cuando el feto nace muerto o muere dentro de las siguientes 24 horas del nacimiento), de residentes en municipios de las áreas de salud de la Región de Murcia, fallecidos en España entre 1980 y 1997, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) al Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).
- Para los nacimientos se ha utilizado la información del Movimiento Natural de Población del INE⁴.

Se han calculado los siguientes indicadores de mortalidad infantil y perinatal:

$$\text{Tasa de mortalidad infantil (TMI)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 1 \text{ año}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal (TMN)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 28 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} > 6 \text{ días y} < 28 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad posneonatal (TMPN)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} > 27 \text{ días y} < 1 \text{ año}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad perinatal (TMP)} = \frac{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación} + \text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación} + \text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT)} = \frac{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación}}{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación} + \text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

Para estudiar las causas más frecuentes de mortalidad infantil se ha utilizado un listado de causas combinado de elaboración propia a partir del publicado por el Ayuntamiento de Barcelona⁵,

adaptado a las causas de MI más prevalentes en la Región (anexo 5), en el que se han unificado los grandes grupos de causas de muerte de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9)⁶, con las causas detalladas más importantes de cada uno de los grandes grupos de causas. Para la mortalidad perinatal se ha utilizado el mismo listado de causas de muerte, ligeramente modificado, con el fin de permitir una mayor desagregación del apartado de *afecciones originadas en el periodo perinatal* (anexo 5).

El estudio de la evolución temporal de la MI y de los periodos que la componen se ha hecho dividiendo el periodo objeto de estudio en esta monografía (1980-1997) en 6 trienios. La razón fundamental del formato de presentación de la información es el pequeño número de muertes infantiles que ocurren en la Región anualmente, lo que dificulta en gran medida la interpretación de las tendencias temporales anuales cuando se estudian separadamente los sexos, áreas de salud o periodos de tiempo.

Los puntos porcentuales de cambio en la tendencia en el texto están calculados a partir de las tasas por mil nacidos.

Esta monografía se estructura en 6 apartados, y se desglosa para el total de la Región de Murcia, y de cada una de sus áreas de salud, que a su vez contienen información de *Tendencias* (años 1980-97) y del último *Periodo quinquenal* disponible (1993-97) en la fase de diseño de la monografía; subdividiéndose en mortalidad perinatal e infantil, y en sus subgrupos. Las tabulaciones de las causas de muerte no se presentan desglosadas por sexo, al ser mínimas las diferencias observadas. Los gráficos se presentan con el mismo rango en la tasa según sea mortalidad infantil o perinatal, para facilitar la comparación visual.

Signos empleados

“-” = Cero en los datos absolutos, o menos de media centésima en las tasas.

PRINCIPALES RESULTADOS

1. MORTALIDAD PERINATAL

1.1. Tendencias

Región de Murcia

Disminuyen las muertes perinatales desde 1980 con 254 decesos que corresponde a una tasa de 13,87 por mil nacidos vivos, y una cota mínima de 84 casos en 1993 y una tasa de 6,27 por mil nacidos vivos (tablas 2.1 y 2.2). La disminución de la mortalidad perinatal se produce sobretudo en el sexo masculino, en el que observa marcado descenso tanto en los casos como en las tasas, pasando de 152 muertes en 1980 a un mínimo de 44 registros, en el año 1993. Las oscilaciones en la tendencia a la baja (tabla 2.1) se linealizan al agrupar los años por trienios (tabla 2.2). En las niñas se registra también una disminución del número de decesos (tablas 2.1 y 2.2) con oscilaciones desde el año 1987 (tabla 2.1), cambiando de los 102 casos de 1980 a 39 en 1996 (tasas de 11,72 a 6,38 por mil nacidos vivos). En los años agrupados por trienios existirían dos bloques 1980-1985 y 1986-1997 con decrementos anuales en el interior de los mismos (gráfica 1).

Las principales grandes causas de muerte perinatal son las denominadas *afecciones perinatales* (sección XV de la CIE-9) y las *anomalías congénitas* (sección XIV de la CIE-9). En todos los trienios la frecuencia es mayor para las *afecciones perinatales* que para las *anomalías congénitas*, siendo las primeras el 78,5% de todas las muertes perinatales frente al 18,6% de las segundas en todo el periodo 1980-97 (tabla 2.3). El resto de grandes causas abarcan menos del 3% de la mortalidad. En ambas se observa una tendencia decreciente tanto en los casos como en las tasas. El principal componente del apartado de las *afecciones perinatales* son las *alteraciones de placenta-del cordón-o de las membranas en feto/recién nacido* (código 762 de la CIE-9 y 28 de la Lista de elaboración propia) que corresponde al 24,0% (574 casos) del total del periodo, y que presenta gradiente descendente en casos y tasas. Le siguen a continuación, la *hipoxia intrauterina y asfixia al nacer* con un 7,8% y 186 casos, y la *dificultad respiratoria del feto/recién nacido* (155 casos y un 6,5%) ambas con tendencia negativa en los índices comentados (gráfica 2). En las *anomalías congénitas predominan las anomalías congénitas múltiples* (5,1% y 121 casos), *las anomalías congénitas del aparato circulatorio* (3,8% y 92 casos) y de las *anomalías congénitas del sistema nervioso* (2,9% y 70 casos).

En los niños se reproduce el mismo patrón que en ambos sexos para las grandes causas de defunción (tabla 2.4). Así, las *afecciones perinatales* representan el 44,7% de las muertes totales y que presentan disminución del número de casos y de las tasas a partir de 1983-85, distinguiéndose en este grupo las *alteraciones de placenta-del cordón-o de las membranas* (334 casos y 24,4%), a la *dificultad respiratoria* (97 casos y 7,1%) -sin tendencia desde 1983-1985-, *menor gestación-bajo peso al nacer* (95 casos y 4%) con tendencia negativa en casos y tasas. Las *anomalías congénitas* alcanzan el 18,8% de los decesos, y la tasa-trienio no descenderá hasta 1992. Las *anomalías múltiples* son las que tienen mayor peso del grupo (72 casos y un 3%), seguidas de las *anomalías congénitas cardiovasculares* (60 casos y un 4,4%) (gráfica 2).

Las defunciones perinatales femeninas mantienen un patrón de causas prevalentes (tabla

2.5). Las *afecciones perinatales* son 33,9% y las *anomalías congénitas* el 7,9% de la mortandad en ambos sexos. Las primeras descienden para luego estabilizarse, y las segundas descienden desde 1983-1985. La ordenación en las causas específicas es: *alteraciones de placenta-del cordón-o de las membranas* como entidad más frecuente con 230 casos y 9,6%, a continuación van *hipoxia intrauterina y asfixia al nacer* con 93 casos y un 3,9% , y la *menor gestación-bajo peso al nacer* con un 2,9% y 69 casos. En las dos primeras la tendencia desciende, mientras que en la última causa citada lo hace el primer trienio para luego estabilizarse (gráfica 2).

Áreas de Salud

Descienden los casos observados y la tasa resultante en todas las áreas sanitarias, excepto en el área VI (Vega del Segura-Comarca Oriental) (anexo 8) con un número mantenido de casos, pero con aumento de la tasa (tabla 4.1). El área I o de Murcia es la que presenta importantes decrementos (10,1 puntos de la tasa) y registra el menor número de casos y la menor tasa en 1995 (36 y 7,04, respectivamente) (tabla 4.3.1.). El área II o de Cartagena parte de una tasa menor a la de Murcia, pero presenta al final un cambio porcentual en la tasa similar (10,6 puntos) (tabla 4.3.2.). El año con menor mortalidad es 1989 con 10 casos que dan una tasa de 2,84 por mil nacidos vivos o muertos. En el área III o de Lorca la variación del cambio es menor que en las demarcaciones precedentes y presenta variabilidad tanto anual como trienal (tabla 4.3.3.). En el área IV o del Noroeste la tendencia desciende, a la vez que presenta el menor número de muertes junto con las tasas más bajas del periodo 95-97 (tabla 4.3.4.). En Altiplano (área de salud V), con más defunciones que el Noroeste, la tendencia está estancada, aunque existan oscilaciones anuales (tabla 4.3.5.). La Vega del Segura, paradójicamente, da sus mayores índices en 1997 (tabla 4.3.6.) (gráfica 3). Todas las áreas sanitarias siguen la ordenación regional, al tener como causas agrupadas más frecuentes a las *afecciones perinatales* y después a las *anomalías congénitas* (gráficas 4 y 5).

1.2. Periodo 1993-1997

Región de Murcia

El epígrafe de *otras afecciones perinatales y las mal definidas* es la causa hegemónica de muerte (132 casos y tasa de 2,06 por mil nacidos vivos y muertos), seguida por *otras alteraciones de la placenta-cordón umbilical-membranas* (tabla 5.6) con 92 casos y una tasa de 1,43, y de *hipoxia intrauterina y asfixia al nacer* con una tercera parte de los casos (30 y tasa de 1,43). Las muertes fetales tardías (mortinatos de 180 o más días) coinciden las dos primeras causas y la cuarta (Tabla 5.6.). Además se evidencia el gran peso de los nacidos muertos al representar 87,1% (115/132) de *otras afecciones perinatales y las mal definidas*, el 95,7% (82/99) de las *alteraciones placenta -cordón umbilical-membranas*, y el 53,3% (156/30) de la *hipoxia intrauterina y asfixia al nacer*, el resto de entidades presenta pocos casos (tabla 5.7.).

Áreas de Salud

Las seis áreas sanitarias mantienen el patrón regional en las dos primeras causas, a excepción del área de Lorca que invierte el ranking entre la primera y segunda causas, pasando las *alteraciones de placenta-cordón umbilical-membranas* a la primera posición. El área de salud de Cartagena es el único territorio que reproduce la ordenación regional, en las cinco primeras causas de muerte perinatal (tablas 6.2.1. a 6.2.6.).

2. MORTALIDAD INFANTIL

2.1. Tendencias

Región de Murcia

La mortalidad infantil ha pasado de una tasa de 14,45 muertes por mil nacidos vivos en 1980 a una tasa de 6,16 en 1997. Por sexos, los niños han pasado de tener una MI de 15,82 en 1980 a una tasa de 6,31 en 1997; en tanto que las niñas han experimentado un menor descenso, pasando de 12,93 a 6,01. Se han producido descensos importantes en la mortalidad en cada uno de los periodos que componen la MI. Así, la mortalidad neonatal ha pasado de 9,50 en 1980 a 3,93 en 1997, mientras que la mortalidad posneonatal ha descendido de una tasa de 4,94 a 2,23. No observamos un traslado de las tasas de mortalidad de la mortalidad neonatal (precoz o tardía) a la posneonatal a lo largo del tiempo, ni en los niños ni en las niñas (tablas 1.1, 1.2 y 1.3, gráficas 8 y 9).

Se pueden describir dos periodos en la tendencia de la MI en la Región: un primer periodo, de 1980 a 1987, en el que se produce un descenso muy acusado de la MI, y un segundo periodo (de 1987 a 1997), en el que se atenúa esta tendencia descendente. En los últimos años las tasas de MI han presentado fluctuaciones, de forma que se alternan años en los que se encuentran las tasas de MI más bajas desde que se recoge este indicador en la Región (1993 y 1995) con años en los que las tasas de MI son similares a las de comienzos de los años 90 (1994 y 1996). (gráfica 8).

El porcentaje del descenso experimentado, tomando como referencia los valores promedios de los periodos 1980-1982 y 1995-1997 ha sido de un 46,1%. Este descenso ha sido ligeramente más acusado en los niños (48,2%), que en las niñas (42,8%). La mortalidad posneonatal ha disminuido en mayor medida que la neonatal, si bien la diferencia es pequeña (49,0% frente a un 44,6%). El descenso experimentado en la mortalidad neonatal precoz y neonatal tardía ha sido muy similar (44,8% y 44,4%). (tablas 1.5 y 1.6). Las diferencias en la mortalidad infantil se mantienen de forma homogénea entre niños y niñas, sin causas concretas que expliquen las diferencias.

Para el estudio de las tendencias en la mortalidad por las distintas causas de MI se han agrupado los 18 años que se presentan, en periodos de tres años. Así, entre el primer periodo (años 1980-82) y el último (1995-97), se aprecia un descenso importante en todos los grandes grupos de causas, salvo el de *enfermedades del aparato genitourinario*, que es el causante de un número muy pequeño de muertes. Los grupos de causas que han experimentado un mayor descenso han sido *los traumatismos y envenenamientos* (85,7%), *las enfermedades infecciosas* (82,4%) y *las enfermedades del aparato respiratorio* (82,5%). El menor descenso ha ocurrido en las *anomalías congénitas* (45,1%) (tabla 1.7).

Entre las causas específicas de MI también se puede observar que ha descendido la mortalidad por la mayor parte de causas, con algunas excepciones. Entre las patologías que han disminuido en mayor medida están: la *neumonía y gripe* (un 76,9% de descenso entre el primer y el último periodo estudiado), las *anomalías congénitas del sistema nervioso* (74,1%), las *complicaciones de la placenta, cordón o membranas* (84,6%), la *prematuridad* (82,9%) y los *traumatismos al nacer* (92,9%). Las únicas causas específicas destacadas de MI que no han descendido han sido: las *anomalías congénitas múltiples* y las *anomalías cromosómicas*. (tabla 1.7).

En la gráfica 10 se muestra el porcentaje de las muertes infantiles que han sido producidas por alguna de las causas pertenecientes a los grupos de *afecciones originadas en el periodo perinatal* o al grupo de *anomalías congénitas*. Se puede observar que ha ido aumentando el peso relativo de las muertes provocadas por *anomalías congénitas*, que han pasado de representar un 30,3% del total de las muertes en el periodo 1980-82 a un 41,7 % en el periodo 1995-97. Por el contrario, el porcen-

taje de muertes ocasionadas por *afecciones originadas en el periodo perinatal* desciende algo, pasando de representar un 43,8% de las muertes en el periodo 1980-82 a un 41,3% en el periodo 1995-97. El conjunto de las muertes provocadas por estos dos grupos de causas representó en el periodo 1980-82 un 74,0% de las muertes, frente a un 82,9% en el último periodo 1995-97.

Áreas de Salud

El *área I (Murcia)* presentaba en el periodo inicial (1980-82) las TMI más elevadas de la Región (14,80 muertes por mil nacidos vivos), sobre todo por una TMN muy elevada. El descenso experimentado es importante tanto en la TMN (57,0%), como en la TMPN (61,9%), para alcanzar al final del periodo una TMI similar a la media regional (6,15 por mil nacidos vivos). (tabla 3.2.1.y gráfica 11).

El *área II (Cartagena)* parte de una TMI parecida a la regional (11,45 por mil) en el periodo inicial, experimentando un notable descenso en estos años (49,1%), en especial causado por la disminución de la TMN (57,3%), para situarse en el último trienio en una TMI de 5,83. (tabla 3.2.2.).

Las TMI del *área III (Lorca)* presentan valores similares a los regionales, tanto en el primer, como en el último periodo estudiados (10,88 y 6,30 respectivamente), con un moderado descenso de la TMN (26,9%), siendo más acusada la tendencia descendente de la TMPN (63,0%) (tabla 3.2.3.).

El *área IV (Noroeste)* presenta tanto en el primer como en el último trienio valores en su TMI inferiores a la media regional, siendo su TMI la más baja de la región en el periodo 1995-97 (4,59), siendo extensible este hecho tanto a la TMN, como a la TMPN. Presenta, por consiguiente, los mejores datos de MI de la Región (tabla 3.2.4.).

En el *área V (Altiplano)*, por el contrario, se observan las TMI más elevadas de la región, tanto en el periodo 1980-82 (13,57), como en el periodo 1995-97 (8,55). Aún así, sus tasas han mostrado un descenso apreciable (37,0%) en la TMI y (61,5%) en la TMPN, aunque insuficiente en la TMN, que únicamente ha descendido un 7,8%. (tabla 3.2.5.).

El *área VI (Vega del Segura-Comarca Oriental)* presenta en el primer trienio una TMI que se encuentra por debajo de la media regional (5,60) y cerca de tres veces inferior a la del área I (la más elevada en estos años). Sin embargo, es el área que ha mostrado una peor evolución, siendo la única en la que la TMI ha aumentado (un 32,0%), hasta alcanzar una TMI de 7,39 en el último trienio. Este aumento ha sido especialmente a expensas de la TMN (que ha crecido un 53,7%), habiendo aumentado también, si bien en menor medida, la TMPN (un 4,9%) (tabla 3.2.6.).

Por lo que respecta a la evolución de las *principales causas de mortalidad infantil* en las distintas áreas de salud, se puede observar que en el *área I* han descendido de manera más importante la mortalidad por *afecciones originadas en el periodo perinatal* que por *anomalías congénitas* (62,0% frente a un 33,2%). En cuanto a las causas específicas de mortalidad, las causas que han experimentado un mayor descenso en esta área han sido: la *neumonía y gripe*, las *anomalías congénitas cardiovasculares y del sistema nervioso* y las *alteraciones de la placenta, cordón o membranas, de la prematuridad y el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) con otras afecciones respiratorias del recién nacido*. Por el contrario, han experimentado una evolución desfavorable (todas ellas han aumentado sus tasas de mortalidad): las *anomalías congénitas del aparato osteomuscular*, las *anomalías congénitas múltiples* y las *anomalías cromosómicas*, entre las anomalías congénitas; así como la *hipoxia intrauterina y la asfixia al nacer*. Por último, las muertes fetales provocadas por *complicaciones maternas del embarazo* y las *infecciones propias del periodo perinatal* apenas han disminuido en el periodo estudiado como causas de mortalidad (tabla 3.3.1.).

El *área II* ha experimentado un descenso similar al área I en los principales grupos de causas de mortalidad infantil. Así, la mortalidad por *anomalías congénitas* ha disminuido un 34,3%, frente a un descenso del 59,0% ocurrido en la mortalidad por *afecciones originadas en el periodo perinatal*.

También en este área ha descendido la mortalidad por *anomalías congénitas del sistema nervioso y las cardiovasculares*, incrementándose la debida a *anomalías cromosómicas*. Entre las afecciones perinatales que han presentado un mayor descenso encontramos las muertes causadas por *complicaciones maternas del embarazo, prematuridad, hipoxia intrauterina y trastornos respiratorios perinatales*. En el área II, la mortalidad por *neumonía y gripe* no ha descendido en estos años (tabla 3.3.2).

En el **área III**, el descenso experimentado por la mortalidad atribuible a *afecciones perinatales y a anomalías congénitas* ha sido muy similar (31,5% y 28,8% respectivamente). Esto se puede explicar por el escaso descenso que ha experimentado la mortalidad por *afecciones originadas en el periodo perinatal* en esta demarcación. Al igual que en las áreas I y II, aquí también ha descendido de manera significativa la mortalidad por *anomalías congénitas del sistema nervioso y del aparato cardiocirculatorio*, incrementándose la provocada por *anomalías congénitas múltiples*. Entre las causas perinatales, ha descendido la mortalidad por *complicaciones placentarias, del cordón o membranas, prematuridad, hipoxia intrauterina y asfixia al nacer y por infecciones perinatales*. Ha aumentado, por el contrario, la mortalidad por *SDR y otras afecciones respiratorias* y la atribuible a *complicaciones maternas del embarazo, y las muertes súbitas del lactante* (tabla 3.3.3).

El **área IV** presenta, como ya se ha comentado con anterioridad una baja mortalidad infantil, tanto si es considerada globalmente, como si se considera cada una de las causas. Es reseñable que en el periodo estudiado se haya observado en esta área, al contrario de las anteriores, un mayor descenso en la mortalidad por *anomalías congénitas* (48,6%), que a la atribuible a *afecciones originadas en el periodo perinatal*, que sólo ha descendido un 8,4%. Del mismo modo que en las áreas ya comentadas, también en esta área se ha producido un notable descenso en las muertes por *anomalías congénitas del sistema nervioso* y algo menor en las *anomalías congénitas cardiovasculares*. Los descensos más significativos entre las muertes por afecciones del periodo perinatal han sido: las muertes por *infecciones perinatales* y por *SDR y otras afecciones respiratorias*. La tasa de mortalidad por *trastornos relacionados con la prematuridad* está aumentada en esta área (tabla 3.3.4).

En el **área V**, la evolución de la mortalidad por *anomalías congénitas* y por *afecciones originadas en el periodo perinatal* han seguido caminos divergentes. Así, mientras las muertes por *anomalías congénitas* disminuyeron un 36,9% (en especial, por el descenso de las muertes por *anomalías cardiocirculatorias y del sistema nervioso*), las muertes por *afecciones originadas en el periodo perinatal* aumentaron un 21,3%. Entre las afecciones de este grupo que aumentaron en su frecuencia destaca el *SDR del recién nacido y otras afecciones respiratorias* (tabla 3.3.5).

El **área VI**, como ya se comentó previamente, ha seguido la peor evolución en sus TMI. Así se puede observar que han aumentado un 42% tanto las muertes debidas a *anomalías congénitas*, como en las *afecciones perinatales*. Entre las *anomalías congénitas*, las únicas que han presentado una evolución favorable han sido las *anomalías congénitas del sistema nervioso*. El resto de las *anomalías congénitas* han experimentado un incremento en su mortalidad, siendo este hecho especialmente relevante para las *anomalías cardiocirculatorias, las congénitas múltiples y las cromosómicas*. La tendencia negativa seguida por las muertes atribuibles a *afecciones originadas en el periodo perinatal* puede ser explicada, al menos parcialmente, por el aumento en las muertes causadas por *hipoxia uterina y asfixia al nacer* y por el *SDR y otras afecciones respiratorias* (tabla 3.3.6).

2.2. Periodo 1993-1997

Región de Murcia

A pesar de la disminución experimentada en los últimos años, la primera causa de mortalidad infantil en la Región de Murcia son las *anomalías congénitas del aparato circulatorio* (tasa de 0,94 por mil nacidos vivos). Otras causas cuantitativamente destacadas de mortalidad en la Región son: el *SDR y otras afecciones respiratorias del RN* (tasa de 0,75), los *trastornos relacionados con la prematuridad*

(0,47), las *anomalías congénitas múltiples* (0,42), la *hipoxia uterina y asfixia al nacer* (0,33) y las *infecciones propias del periodo perinatal* (0,31) (tabla 5.1).

Las principales causas de mortalidad neonatal son similares a las causantes de la MI, si bien el *SDR y otras afecciones respiratorias del recién nacido* (0,66 por mil nacidos vivos) causan un mayor número de muertes en este periodo que las *anomalías congénitas circulatorias* (0,47). Otras causas reseñables de mortalidad en el periodo neonatal son los *trastornos relacionados con la prematuridad* (0,45) y las *anomalías congénitas múltiples* (0,36) (tabla 5.2).

Del mismo modo, en el periodo neonatal precoz el *SDR y otras afecciones respiratorias del recién nacido*, causan el mayor número de defunciones (0,45); en este periodo tienen también un peso más destacado en la mortalidad los *trastornos relacionados con la prematuridad* (0,39) que las *anomalías congénitas múltiples* (0,30) (tabla 5.3).

Las principales causas de muerte en el periodo neonatal tardío, en el que la mortalidad es menor, son igualmente el *SDR y otras respiratorias* (0,20) y las *anomalías congénitas del aparato circulatorio* (0,20) (tabla 5.4).

El mayor número de las muertes que se produce en el periodo posneonatal está relacionado con las *anomalías congénitas circulatorias* (0,47), siendo causas de muerte menos importantes cuantitativamente, el *síndrome de muerte súbita del lactante* (0,17) y la *neumonía y gripe* (0,14) (tabla 5.5).

Áreas de Salud

Las dos principales causas de mortalidad en 5 de las 6 áreas de salud son el *SDR y las anomalías congénitas del aparato circulatorio*. En el periodo estudiado, 1993-97, las *anomalías congénitas cardiovasculares* han sido la primera causas de MI en las áreas I, II, IV y VI y la segunda en las áreas III y V. El *SDR* inversamente ha sido la primera causa de muertes infantiles en las áreas III y V y la segunda en las áreas I, II y IV (tablas 6.1.1. a 6.1.6).

DISCUSIÓN

MORTALIDAD PERINATAL

La declaración de la mortalidad infantil y perinatal: exhaustividad y validez.

En el epígrafe *otras afecciones mal definidas perinatales* (nº 39.7 de la lista) se incluyen los BEP en blanco⁷ (código 779.9). Su importancia ha ido en aumento tanto en números absolutos como en los distintos índices relativos. Todo ello, en detrimento de la calidad de la estadística de mortalidad perinatal (cuadro 1). Así la tasa de boletines sin cumplimentar la causa de muerte fue de 0,39 por mil nacidos vivos o muertos, para toda la mortalidad perinatal y de 0,34 para el subgrupo de las muertes fetales tardías, en el quinquenio 1993-97.

Cuadro 1. Boletines Estadísticos de Parto* sin declarar la causa en la mortalidad perinatal por periodo. Ambos sexos. Región de Murcia, 1980-1997.

Periodo	nº	%	Tasa
1980-1982	18	3,0	0,12
1983-1985	51	11,5	0,38
1986-1988	56	17,8	0,44
1989-1991	69	20,3	0,55
1992-1994	79	26,6	0,66
1995-1997	79	32,9	0,69

(*) *Impresos para mortinatos de 180 días o más de gestación y nacidos vivos muertos en el día.*

(%) *de casos sobre el de todas las defunciones perinatales del trienio.*

Tasa por mil nacidos vivos o muertos.

La mala calidad en la notificación avalaría la existencia de una potencial infradeclaración, que ya ha sido puesta en evidencia en aquellas CC.AA. o ciudades que han estudiado la exhaustividad en la declaración del BEP, mediante encuestas *ad hoc*, con búsqueda de información clínica documental aneja. La magnitud estimada es en el último quinquenio de los años 80, del 35% (45,5% en las muertes fetales y 22,5% en la etapa neonatal precoz)⁸. En Asturias y en la ciudad de Barcelona registran un 24,9% de infradeclaración (feto de 500 o más g. o al menos 22 semanas de gestación) en el decenio 1985-94, con tendencia a disminuir⁹. Estudios similares se reproducen en Amsterdam y en la *regió centre* del mapa sanitario de Cataluña¹⁰. En Navarra la infradeclaración es del 8,9%, y es más marcada en las defunciones durante las primeras 24 horas de vida^{11, 12}. En la región de Murcia la infradeclaración sería de al menos un 18,4% (anexo 9).

La cumplimentación del BEP es insuficiente y requiere de intervenciones institucionales para la mejora de su exhaustividad, y de un protocolo de búsqueda de la información en causas de muerte inválidas, incompletas e inconsistentes. La búsqueda activa en la documentación asistencial para la exactitud en la consignación del peso y del tiempo de gestación debería hacerlos homologables con la publicación de las denominadas "estadísticas nacionales" según la OMS y la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) -que incluyen las muertes fetales de más de 500 g. o en su defecto de 22 semanas de gestación-. En los Estados Unidos se critica la falta de rigor y uniformidad

en la codificación, clasificación y de procedimientos en las muertes fetales, postergada por ejecución del módulo MICAR (*Mortality Medical Indexing, Classification and Retrieval*) -diccionario de entidades médicas asociadas a códigos¹³ - para la codificación automática en CIE-10¹⁴. También es norma en los países anglosajones y escandinavos publicar las estadísticas vitales según indicadores socioeconómicos^{16, 17}. En España mientras tanto, seguiremos postulando por un acuerdo entre los ministerios de Justicia, Economía y Sanidad, que contemple la legislación necesaria para disponer de un nuevo impreso oficial para la certificación de la defunción perinatal¹⁵ que permita generar 'estadísticas nacionales' según los criterios de la OMS e indicadores socioeconómicos^{16, 17, 18}.

MORTALIDAD INFANTIL

La mortalidad infantil española en la Unión Europea

En los tres últimos años disponibles^{19, 20}, se observa que España ocupa malas posiciones en el contexto europeo (cuadro 2). La región de Murcia disponía, de datos algo peores (6,4 por mil nacidos vivos) a los de España.

Cuadro 2. Tasas* de mortalidad infantil en los países de la Unión Europea, 1994-96.

	1994	1995	1996
Alemania	5,6	5,3	5,0
Austria	6,3	5,4	5,1
Bélgica	7,7	6,1	7,7
Dinamarca	5,7	5,1	5,5
España	6,2	5,6	6,0
Finlandia	4,7	3,9	4,0
Francia	5,9	4,9	4,9
Grecia	7,9	8,1	7,2
Irlanda	6,0	6,3	6,3
Italia	6,5	6,2	7,1
Luxemburgo	5,3	4,4	4,9
Países Bajos	5,6	5,5	5,7
Portugal	8,1	7,5	6,9
Reino Unido	6,1	6,2	6,0
Suecia	4,7	4,2	4,0

(*) Tasas por mil nacidos vivos

Fuente: Referencias 19 y 21

En los dos países mejor situados Suecia y Finlandia en 1996, los principales componentes de la mortalidad infantil son *ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal* (tasas de 1,8 y de 1,4 respectivamente, por mil nacidos vivos) y las *anomalías congénitas* con tasas de 1,3 y de 1,5, respectivamente, por mil nacidos vivos, según publica la OMS²¹.

La mortalidad infantil regional en España

En el periodo 1980-1982, la TMI en España fue de 12,05 defunciones por mil nacidos vivos. Durante este mismo periodo, la TMI en la Región de Murcia fue de 11,66, esto es, en torno a un 3% inferior a la nacional. En el último trienio estudiado en esta monografía (1995-1997), la TMI en España ha sido de 5,35, siendo la de la Región de Murcia de 6,28. En estos 3 años, por tanto, la TMI regional ha sido alrededor de un 17% más elevada que la nacional. De esta forma, el descenso experimentado por la TMI nacional entre estos dos periodos ha sido de un 55,6%, frente a un 46,1% en la región.

Del mismo modo, si se comparan las cifras de MI regionales con otras de las Comunidades

Autónomas, se observa que mientras en el periodo 1980-1982, únicamente 5 CCAA presentaban TMI menores a las de la Región de Murcia, en el periodo 1995-1997 la TMI de nuestra región es la más elevada de todas las CCAA peninsulares, siendo solo inferior a la TMI de Ceuta y Melilla. La Región de Murcia es igualmente la comunidad que ha experimentado un menor descenso en su TMI entre los dos trienios citados. Además, sabemos que las desigualdades en la mortalidad infantil, neonatal y posneonatal entre las provincias no habían disminuido de 1940 a 1986 en España, y que la tasa de la mortalidad posneonatal ha presentado la mayor dispersión²².

Para profundizar en las razones que expliquen la mala situación de la región dentro del contexto nacional de este importante indicador sanitario, resulta orientativo comparar las tasas de mortalidad de la región en cada uno de los periodos que componen la MI (neonatal y posneonatal), con los datos nacionales. Así, durante los años 1995-1997, la TM neonatal nacional fue de 3,41, siendo la de la región de 4,24 (un 25% más elevada). Por el contrario, las diferencias entre las TM posneonatal fueron únicamente de un 5% (1,94 muertes por mil nacidos vivos en España y 2,04 en la región de Murcia).

Las comparaciones entre los datos nacionales y los regionales respecto a las causas de MI en el periodo 1995-1997 son esclarecedoras. Así, se constata que la TMI por el grupo de las *anomalías congénitas* fue de 1,93 en España, frente a 2,62 en la región (un 36% más elevada). Las diferencias en la mortalidad provocada por el grupo de *afecciones originadas en el periodo perinatal*, por el contrario, no fueron tan acusadas. Así, la TMI nacional por estas causas fue de 2,25 frente a 2,59 en la región (un 15% más elevada). Estando atribuida la disminución de la mortalidad infantil al inicio de los años 80 en España, al descenso de las enfermedades perinatales, y entre éstas, a inmadurez fetal y en complicaciones obstétricas²³.

Otro problema añadido son las discordancias entre fuentes distintas de casos de mortalidad (CREM e INE), aunque los datos los generaba el CREM, tienen la consideración de provisionales, frente a los datos INE, que son los oficiales. Así en el periodo 1989-91 se registran 18 casos de muerte súbita del lactante en la región²⁴, y en esta monografía con datos del INE aparecen 17.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

CONCLUSIONES

- La tendencia de la mortalidad perinatal e infantil en los 18 años es descendente, tanto en niños como en niñas.
- La mortalidad regional infantil es media-alta, y un 17% superior a la media nacional.
- La mortalidad neonatal regional es la que presenta un mayor diferencial negativo con el conjunto estatal. La mortalidad posneonatal presenta índices similares al promedio español.
- Se mantienen de forma homogénea las diferencias en la mortalidad infantil entre sexos, sin causas concretas que las expliquen.
- La mortalidad regional perinatal e infantil disminuyen, sobretodo en el sexo masculino y en la etapa neonatal.

RECOMENDACIÓN

- Mejorar la exhaustividad en la declaración en la cumplimentación fidedigna de las causas de muerte, indicando el peso al nacer y las semanas de gestación en el Boletín Estadístico de Parto.

BIBLIOGRAFÍA

- 1 Tormo MJ. Mortalidad infantil, 1980. Bol Epidemiol Murcia 1987;9(424):99-104.
- 2 Cirera LI. Evolución de la mortalidad infantil en la Región de Murcia, 1975-1990. Bol Epidemiol Murcia 1992;13(513):51 y 54.
- 3 Gutiérrez JL, Regidor E. Evolución de la mortalidad en el primer año de vida en España (1957-1988). Gac Sanit 1993; 7:110-5.
- 4 <http://www.ine.es/tempus/cgi-bin/itie>
- 5 Borrell C, Plasència A. Informe sobre la mortalitat perinatal durant els anys 1985, 1986 i 1987 a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Municipal de la Salut. Ajuntament de Barcelona; 1989.
- 6 Organización Panamericana de Salud. Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Washington: OPS; 1978.
- 7 Instituto Nacional de Estadística. Manual de codificación de causas perinatales de defunción. Documento Técnico. Madrid: INE; 1994.
- 8 Mosquera C, González-Rico M. Calidad del registro de muertes perinatales. Asturias, 1986-90. Gac Sanit 1994;8:112-6.
- 9 Ferrando J, Borrell C, Ricart M, Plasència A. Infradeclaración de la mortalidad perinatal: la experiencia de 10 años de vigilancia activa en Barcelona. Med Clin 1997;108:330-5.
- 10 Revert M, Rué M, Pérez G, Foradada C, Moral A, Borrell C et al. La mortalitat perinatal a la Regió Sanitària Centre: estudi de l'infraregistrament, comparació entre els diferents sectors sanitaris i propostes de futur (Memòria presentada al <<V Premi Ferran Salas i Roig de Salut Pública>>), diciembre de 1994.
- 11 Castilla J, Moreno C, Eguino E. Validez de las estadísticas de mortalidad infantil en Navarra. Gac Sanit 1992;31:153-6.
- 12 Castilla J, Moreno C, Eguino E. Mortalidad infantil en Navarra. 1985-1989. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Salud; 1993.
- 13 Pérez G. La codificación automática de las causas de muerte y la CIE-10. En: Cirera LI, Vázquez E. La implantación en España de la Clasificación Internacional 10ª - Revisión [CIE-10]. Santiago: Sociedad Española de Epidemiología; 1998. p. 108-9.
- 14 Atkinson D. Improving Cause-of-Death Statistics: The Case of Fetal Death. [Editorial]. Am J Public Health 1993; 83(8):1084-5.
- 15 Plasència A. Las estadísticas de mortalidad perinatal en España: ¿hay que tirar la toalla?. [Editorial] Gac Sanit 1990;4(18):91-2.

- 16 Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. La medición de la clase social en ciencias de la salud. Barcelona: SG Editores, 1995. p 29-40, 50-61, 106-16.
- 17 Grupo de trabajo de la SEE y grupo de clasificación de la SEMFyC. Una propuesta de medida de la clase social. *Aten Primaria* 2000; 25:350-363.
- 18 Cirera LI, Tormo MJ, Santiuste C, Chirlaque MD, Galvañ F, Navarro C. ¿Son la ocupación y la educación intercambiables como indicadores sociales en salud comunitaria? Un estudio en población ocupada. *At Primaria* 2000; 26(9):614-619
- 19 www.iea.junta-andalucia.es/sima_web/
- 20 Regidor E, Gutiérrez-Fisac JL. Indicadores de salud. Cuarta evaluación en España del Programa regional Europeo de Salud para Todos Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 1999.
- 21 <http://www.who.int/whosis/>
- 22 Ladelli P, de Dios J, Masa J, López R, Delgado M, Gálvez R. Desigualdades en salud: la mortalidad perinatal e infantil en España. *Gac Sanit* 1993; 7:21-6.
- 23 Centro Nacional de Epidemiología. Mortalidad en España y Comunidades Autónomas 1989-92. Situación europea. Madrid: CNE, Instituto de Salud Carlos III; 1997. p. 73
- 24 Espín MI, Cirera LI, Navarro A. Síndrome de la muerte súbita del lactante. *Bol Epidemiol* 1994; 15: 31 y 36.

1 REGIÓN DE MURCIA

Tendencias mortalidad infantil

**1.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	263	14,45	173	9,50	140	7,69	33	1,81	90	4,94
1981	152	9,07	103	6,15	73	4,36	30	1,79	49	2,92
1982	186	11,22	119	7,18	80	4,83	39	2,35	67	4,04
1983	163	10,62	103	6,71	80	5,21	23	1,50	60	3,91
1984	147	9,89	91	6,12	60	4,04	31	2,09	56	3,77
1985	132	9,07	83	5,71	62	4,26	21	1,44	49	3,37
1986	109	7,81	73	5,23	56	4,01	17	1,22	36	2,58
1987	100	7,14	59	4,22	41	2,93	18	1,29	41	2,93
1988	106	7,58	75	5,37	48	3,43	27	1,93	31	2,22
1989	119	8,50	71	5,07	50	3,57	21	1,50	48	3,43
1990	95	6,85	60	4,33	39	2,81	21	1,51	35	2,52
1991	126	9,14	84	6,09	63	4,57	21	1,52	42	3,05
1992	127	9,22	85	6,17	57	4,14	28	2,03	42	3,05
1993	79	5,92	49	3,67	34	2,55	15	1,12	30	2,25
1994	91	7,28	64	5,12	51	4,08	13	1,04	27	2,16
1995	62	4,93	40	3,18	32	2,55	8	0,64	22	1,75
1996	98	7,75	71	5,61	49	3,87	22	1,74	27	2,13
1997	80	6,16	51	3,93	39	3,00	12	0,92	29	2,23

**1.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	151	15,82	99	10,37	81	8,49	18	1,89	52	5,45
1981	96	10,94	64	7,30	44	5,02	20	2,28	32	3,65
1982	111	13,06	74	8,71	50	5,88	24	2,82	37	4,35
1983	91	11,36	59	7,37	43	5,37	16	2,00	32	4,00
1984	73	9,56	45	5,89	33	4,32	12	1,57	28	3,67
1985	81	10,78	54	7,19	41	5,46	13	1,73	27	3,59
1986	68	9,34	47	6,45	35	4,81	12	1,65	21	2,88
1987	60	8,31	35	4,85	25	3,46	10	1,38	25	3,46
1988	53	7,28	37	5,08	25	3,43	12	1,65	16	2,20
1989	67	9,18	46	6,30	32	4,39	14	1,92	21	2,88
1990	53	7,44	34	4,77	24	3,37	10	1,40	19	2,67
1991	67	9,56	48	6,85	37	5,28	11	1,57	19	2,71
1992	76	10,61	51	7,12	36	5,03	15	2,09	25	3,49
1993	43	6,16	28	4,01	20	2,87	8	1,15	15	2,15
1994	57	8,79	38	5,86	34	5,24	4	0,62	19	2,93
1995	33	5,10	18	2,78	15	2,32	3	0,46	15	2,32
1996	61	9,31	43	6,56	30	4,58	13	1,98	18	2,75
1997	42	6,31	26	3,90	19	2,85	7	1,05	16	2,40

**1.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	112	12,93	74	8,55	59	6,81	15	1,73	38	4,39
1981	56	7,01	39	4,88	29	3,63	10	1,25	17	2,13
1982	75	9,29	45	5,57	30	3,71	15	1,86	30	3,71
1983	72	9,81	44	6,00	37	5,04	7	0,95	28	3,82
1984	74	10,24	46	6,37	27	3,74	19	2,63	28	3,88
1985	51	7,25	29	4,12	21	2,99	8	1,14	22	3,13
1986	41	6,14	26	3,90	21	3,15	5	0,75	15	2,25
1987	40	5,9	24	3,54	16	2,36	8	1,18	16	2,36
1988	53	7,92	38	5,68	23	3,44	15	2,24	15	2,24
1989	52	7,77	25	3,73	18	2,69	7	1,05	27	4,03
1990	42	6,22	26	3,85	15	2,22	11	1,63	16	2,37
1991	59	8,7	36	5,31	26	3,83	10	1,47	23	3,39
1992	51	7,72	34	5,15	21	3,18	13	1,97	17	2,57
1993	36	5,65	21	3,30	14	2,20	7	1,10	15	2,35
1994	34	5,66	26	4,33	17	2,83	9	1,50	8	1,33
1995	29	4,76	22	3,61	17	2,79	5	0,82	7	1,15
1996	37	6,07	28	4,59	19	3,12	9	1,48	9	1,48
1997	38	6,01	25	3,96	20	3,17	5	0,79	13	2,06

**1.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	601	11,66	395	7,66	293	5,69	102	1,98	206	4,00
1983-1985	442	9,88	277	6,19	202	3,46	75	1,68	165	3,69
1986-1988	315	7,51	207	4,94	145	4,51	62	1,48	108	2,58
1989-1991	340	8,16	215	5,16	152	3,65	63	1,51	125	3,00
1992-1994	297	7,50	198	5,00	142	3,58	56	1,41	99	2,50
1995-1997	240	6,28	162	4,24	120	3,14	42	1,10	78	2,04

**1.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	358	13,35	237	8,84	175	6,53	62	2,31	121	4,51
1983-1985	245	10,58	158	6,82	117	3,90	41	1,77	87	3,76
1986-1988	181	8,31	119	5,46	85	5,05	34	1,56	62	2,85
1989-1991	187	8,73	128	5,97	93	4,34	35	1,63	59	2,75
1992-1994	176	8,53	117	5,67	90	4,36	27	1,31	59	2,86
1995-1997	136	6,91	87	4,42	64	3,25	23	1,17	49	2,49

**1.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	243	9,83	158	6,39	118	4,77	40	1,62	85	3,44
1983-1985	197	9,12	119	5,51	85	2,98	34	1,57	78	3,61
1986-1988	134	6,65	88	4,37	60	3,94	28	1,39	46	2,28
1989-1991	153	7,56	87	4,30	59	2,92	28	1,38	66	3,26
1992-1994	121	6,37	81	4,27	52	2,74	29	1,53	40	2,11
1995-1997	104	5,62	75	4,05	56	3,03	19	1,03	29	1,57

**1.7. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	601	11,66	442	9,88	315	7,51	340	8,16	297	7,50	240	6,28
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	0,33	20	0,45	9	0,21	9	0,22	6	0,15	3	0,08
1. Enfermedades infecciosas intestinales	4	0,08	4	0,09	1	0,02	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	3	0,06	7	0,16	2	0,05	2	0,05	2	0,05	1	0,03
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	10	0,19	9	0,20	6	0,14	7	0,17	4	0,10	2	0,05
II. Tumores	8	0,16	4	0,09	6	0,14	-	-	3	0,08	3	0,08
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	9	0,17	8	0,18	5	0,12	3	0,07	7	0,18	3	0,08
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	2	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	2	0,04	1	0,02	1	0,02	2	0,05	1	0,03
6. Fibrosis quística	2	0,04	3	0,07	-	-	1	0,02	1	0,03	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	1	0,02	3	0,08	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	5	0,10	3	0,07	4	0,10	-	-	1	0,03	2	0,05
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	0,06	2	0,04	1	0,02	2	0,05	-	-	1	0,03
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	13	0,25	11	0,25	10	0,24	6	0,14	7	0,18	5	0,13
9. Meningitis	6	0,12	3	0,07	2	0,05	1	0,02	2	0,05	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	4	0,09	2	0,05	1	0,02	2	0,05	3	0,08
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	7	0,14	4	0,09	6	0,14	4	0,10	3	0,08	2	0,05
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	16	0,31	25	0,56	28	0,67	12	0,29	4	0,10	5	0,13
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	40	0,78	25	0,56	13	0,31	14	0,34	10	0,25	7	0,18
12. Asma	-	-	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	1	0,02	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	26	0,50	15	0,34	6	0,14	6	0,14	9	0,23	6	0,16
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	14	0,27	9	0,20	7	0,17	7	0,17	1	0,03	1	0,03
IX. Enfermedades del aparato digestivo	7	0,14	5	0,11	7	0,17	5	0,12	3	0,08	3	0,08
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	2	0,04	-	-	-	-	-	-	1	0,03	1	0,03
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	5	0,10	5	0,11	7	0,17	5	0,12	2	0,05	2	0,05
X. Enfermedades del aparato genitourinario	1	0,02	-	-	7	0,17	1	0,02	1	0,03	2	0,05

**1.7. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	182	3,53	143	3,20	115	2,74	116	2,79	97	2,45	100	2,62
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	27	0,52	29	0,65	14	0,33	16	0,38	8	0,20	7	0,18
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	93	1,80	53	1,18	43	1,03	47	1,13	33	0,83	43	1,13
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	5	0,10	9	0,20	7	0,17	7	0,17	9	0,23	4	0,10
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	5	0,10	6	0,13	3	0,07	3	0,07	5	0,13	3	0,08
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,02	2	0,04	1	0,02	2	0,05	6	0,15	2	0,05
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,04	5	0,11	6	0,14	6	0,14	5	0,13	10	0,26
24. Anomalías cromosómicas	12	0,23	7	0,16	9	0,21	10	0,24	10	0,25	11	0,29
25. Anomalías congénitas múltiples	16	0,31	21	0,47	18	0,43	20	0,48	18	0,45	17	0,45
26. Resto de anomalías congénitas	21	0,41	11	0,25	14	0,33	5	0,12	3	0,08	3	0,08
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	263	5,10	170	3,80	97	2,31	138	3,31	132	3,33	99	2,59
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	13	0,25	9	0,20	1	0,02	2	0,05	11	0,28	6	0,16
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	13	0,25	12	0,27	5	0,12	8	0,19	2	0,05	2	0,05
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	70	1,36	42	0,94	29	0,69	16	0,38	22	0,56	12	0,31
30. Traumatismo al nacer	14	0,27	1	0,02	-	-	11	0,26	9	0,23	1	0,03
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	18	0,35	12	0,27	14	0,33	14	0,34	16	0,40	13	0,34
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	53	1,03	33	0,74	26	0,62	49	1,18	26	0,66	28	0,73
33. Infecciones propias del periodo perinatal	24	0,47	19	0,42	7	0,17	9	0,22	13	0,33	12	0,31
34. Hemorragia perinatal	2	0,04	3	0,07	1	0,02	4	0,10	3	0,08	1	0,03
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	1	0,02	3	0,07	-	-	-	-	1	0,03	1	0,03
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	3	0,06	-	-	1	0,02	-	-	2	0,05	1	0,03
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	5	0,10	-	-	1	0,02	7	0,17	6	0,15	5	0,13
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	1	0,02	-	-	1	0,03	2	0,05
39. Resto de afecciones perinatales	47	0,91	36	0,80	11	0,26	18	0,43	20	0,50	15	0,39
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	14	0,27	17	0,38	13	0,31	23	0,55	20	0,50	5	0,13
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	10	0,19	8	0,18	12	0,29	17	0,41	13	0,33	4	0,10

**1.7. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	4	0,08	9	0,20	1	0,02	6	0,14	7	0,18	1	0,03
XVII. Traumatismos y envenenamientos	28	0,54	12	0,27	4	0,10	11	0,26	7	0,18	4	0,10
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	14	0,27	6	0,13	2	0,05	5	0,12	3	0,08	1	0,03
43. Resto de accidentes	14	0,27	6	0,13	2	0,05	6	0,14	4	0,10	3	0,08
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.8. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	358	13,35	245	10,58	181	8,31	187	8,73	176	8,53	136	6,91
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	12	0,45	13	0,56	6	0,28	2	0,09	2	0,10	2	0,10
1. Enfermedades infecciosas intestinales	3	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	3	0,11	6	0,26	2	0,09	-	-	-	-	1	0,05
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,22	7	0,30	4	0,18	2	0,09	2	0,10	1	0,05
II. Tumores	5	0,19	3	0,13	5	0,23	-	-	2	0,10	3	0,15
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	1	0,04	2	0,09	3	0,14	1	0,05	6	0,29	1	0,05
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	1	0,04	-	-	-	-	1	0,05	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	1	0,05	3	0,15	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	1	0,04	1	0,04	2	0,09	-	-	1	0,05	1	0,05
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,04	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	0,22	5	0,22	4	0,18	1	0,05	3	0,15	3	0,15
9. Meningitis	2	0,07	2	0,09	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	1	0,04	1	0,05	-	-	1	0,05	2	0,10
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	4	0,15	2	0,09	2	0,09	1	0,05	1	0,05	1	0,05
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	11	0,41	14	0,60	17	0,78	5	0,23	1	0,05	3	0,15
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	28	1,04	20	0,86	10	0,46	7	0,33	6	0,29	6	0,30
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	19	0,71	12	0,52	4	0,18	3	0,14	6	0,29	5	0,25
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	9	0,34	8	0,35	6	0,28	3	0,14	-	-	1	0,05
IX. Enfermedades del aparato digestivo	7	0,26	4	0,17	5	0,23	2	0,09	2	0,10	3	0,15
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	2	0,07	-	-	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	5	0,19	4	0,17	5	0,23	2	0,09	1	0,05	2	0,10
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	4	0,18	-	-	-	-	-	-

**1.8. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	110	4,10	69	2,98	61	2,80	62	2,89	53	2,57	58	2,95
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	15	0,56	10	0,43	5	0,23	7	0,33	4	0,19	3	0,15
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	59	2,20	27	1,17	21	0,96	26	1,21	19	0,92	23	1,17
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	4	0,15	6	0,26	6	0,28	4	0,19	5	0,24	3	0,15
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	3	0,11	1	0,04	1	0,05	1	0,05	3	0,15	2	0,10
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,04	-	-	1	0,05	1	0,05	3	0,15	1	0,05
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04	3	0,13	2	0,09	4	0,19	3	0,15	8	0,41
24. Anomalías cromosómicas	3	0,11	3	0,13	5	0,23	6	0,28	6	0,29	6	0,30
25. Anomalías congénitas múltiples	9	0,34	13	0,56	10	0,46	11	0,51	9	0,44	12	0,61
26. Resto de anomalías congénitas	15	0,56	6	0,26	10	0,46	2	0,09	1	0,05	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	152	5,67	97	4,19	58	2,66	86	4,01	81	3,93	51	2,59
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	6	0,22	5	0,22	1	0,05	2	0,09	8	0,39	2	0,10
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	7	0,26	10	0,43	1	0,05	5	0,23	2	0,10	1	0,05
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	38	1,42	24	1,04	22	1,01	12	0,56	12	0,58	3	0,15
30. Traumatismo al nacer	7	0,26	-	-	-	-	4	0,19	6	0,29	1	0,05
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	11	0,41	7	0,30	8	0,37	9	0,42	10	0,48	7	0,36
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	35	1,31	18	0,78	13	0,60	32	1,49	17	0,82	18	0,91
33. Infecciones propias del periodo perinatal	9	0,34	11	0,48	3	0,14	4	0,19	6	0,29	7	0,36
34. Hemorragia perinatal	2	0,07	2	0,09	1	0,05	2	0,09	1	0,05	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	1	0,04	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,05
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	3	0,11	-	-	-	-	5	0,23	5	0,24	3	0,15
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,05	2	0,10
39. Resto de afecciones perinatales	32	1,19	19	0,82	9	0,41	11	0,51	13	0,63	6	0,30
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	10	0,37	9	0,39	7	0,32	16	0,75	14	0,68	3	0,15
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	7	0,26	3	0,13	7	0,32	11	0,51	8	0,39	2	0,10

**1.8. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	3	0,11	6	0,26	-	-	5	0,23	6	0,29	1	0,05
XVII. Traumatismos y envenenamientos	15	0,56	9	0,39	1	0,05	4	0,19	6	0,29	3	0,15
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	8	0,30	4	0,17	-	-	3	0,14	3	0,15	1	0,05
43. Resto de accidentes	7	0,26	5	0,22	1	0,05	1	0,05	3	0,15	2	0,10
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.9. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	243	9,83	197	9,12	134	6,65	153	7,56	121	6,37	104	5,62
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	5	0,20	7	0,32	3	0,15	7	0,35	4	0,21	1	0,05
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,04	4	0,19	1	0,05	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	1	0,05	-	-	2	0,10	2	0,11	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,16	2	0,09	2	0,10	5	0,25	2	0,11	1	0,05
II. Tumores	3	0,12	1	0,05	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	8	0,32	6	0,28	2	0,10	2	0,10	1	0,05	2	0,11
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	2	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	1	0,05	1	0,05
6. Fibrosis quística	2	0,08	2	0,09	-	-	1	0,05	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	4	0,16	2	0,09	2	0,10	-	-	-	-	1	0,05
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,08	2	0,09	1	0,05	1	0,05	-	-	1	0,05
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7	0,28	6	0,28	6	0,30	5	0,25	4	0,21	2	0,11
9. Meningitis	4	0,16	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	3	0,14	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	3	0,12	2	0,09	4	0,20	3	0,15	2	0,11	1	0,05
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	5	0,20	11	0,51	11	0,55	7	0,35	3	0,16	2	0,11
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	12	0,49	5	0,23	3	0,15	7	0,35	4	0,21	1	0,05
12. Asma	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	7	0,28	3	0,14	2	0,10	3	0,15	3	0,16	1	0,05
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	5	0,20	1	0,05	1	0,05	4	0,20	1	0,05	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	1	0,05	2	0,10	3	0,15	1	0,05	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	1	0,05	2	0,10	3	0,15	1	0,05	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	1	0,04	-	-	3	0,15	1	0,05	1	0,05	2	0,11

**1.9. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	72	2,91	74	3,43	54	2,68	54	2,67	44	2,32	42	2,27
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	12	0,49	19	0,88	9	0,45	9	0,44	4	0,21	4	0,22
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	34	1,38	26	1,20	22	1,09	21	1,04	14	0,74	20	1,08
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	1	0,04	3	0,14	1	0,05	3	0,15	4	0,21	1	0,05
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	2	0,08	5	0,23	2	0,10	2	0,10	2	0,11	1	0,05
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	3	0,16	1	0,05
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04	2	0,09	4	0,20	2	0,10	2	0,11	2	0,11
24. Anomalías cromosómicas	9	0,36	4	0,19	4	0,20	4	0,20	4	0,21	5	0,27
25. Anomalías congénitas múltiples	7	0,28	8	0,37	8	0,40	9	0,44	9	0,47	5	0,27
26. Resto de anomalías congénitas	6	0,24	5	0,23	4	0,20	3	0,15	2	0,11	3	0,16
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	111	4,49	73	3,38	39	1,94	52	2,57	51	2,69	48	2,59
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	7	0,28	4	0,19	-	-	-	-	3	0,16	4	0,22
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	6	0,24	2	0,09	4	0,20	3	0,15	-	-	1	0,05
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	32	1,29	18	0,83	7	0,35	4	0,20	10	0,53	9	0,49
30. Traumatismo al nacer	7	0,28	1	0,05	-	-	7	0,35	3	0,16	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	7	0,28	5	0,23	6	0,30	5	0,25	6	0,32	6	0,32
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	18	0,73	15	0,69	13	0,65	17	0,84	9	0,47	10	0,54
33. Infecciones propias del periodo perinatal	15	0,61	8	0,37	4	0,20	5	0,25	7	0,37	5	0,27
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,05	-	-	2	0,10	2	0,11	1	0,05
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	2	0,09	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	2	0,08	-	-	1	0,05	-	-	2	0,11	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	2	0,08	-	-	1	0,05	2	0,10	1	0,05	2	0,11
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	15	0,61	17	0,79	2	0,10	7	0,35	7	0,37	9	0,49
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	4	0,16	8	0,37	6	0,30	7	0,35	6	0,32	2	0,11
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	3	0,12	5	0,23	5	0,25	6	0,30	5	0,26	2	0,11

**1.9. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	1	0,04	3	0,14	1	0,05	1	0,05	1	0,05	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	13	0,53	3	0,14	3	0,15	7	0,35	1	0,05	1	0,05
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	6	0,24	2	0,09	2	0,10	2	0,10	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	7	0,28	1	0,05	1	0,05	5	0,25	1	0,05	1	0,05
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 **REGIÓN DE MURCIA** **Tendencias mortalidad perinatal**

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal por sexo. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	<u>Ambos sexos</u>		<u>Niños</u>		<u>Niñas</u>	
	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>
1980	254	13,87	152	15,81	102	11,72
1981	166	9,85	92	10,43	74	9,21
1982	161	9,67	92	10,77	69	8,50
1983	157	10,18	93	11,54	64	8,69
1984	166	11,09	91	11,82	75	10,31
1985	165	11,26	96	12,69	69	9,74
1986	140	9,97	80	10,92	60	8,94
1987	108	7,68	70	9,63	38	5,59
1988	130	9,25	72	9,82	58	8,62
1989	108	7,69	62	8,46	46	6,84
1990	116	8,32	66	9,21	50	7,37
1991	133	9,60	80	11,35	53	7,78
1992	120	8,67	66	9,18	54	8,13
1993	84	6,27	44	6,28	40	6,25
1994	105	8,37	58	8,91	47	7,78
1995	86	6,81	44	6,77	42	6,86
1996	99	7,80	60	9,11	39	6,38
1997	98	7,52	49	7,32	49	7,72

2.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal por sexo. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	<u>Ambos sexos</u>		<u>Niños</u>		<u>Niñas</u>	
	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>	<u>Defun.</u>	<u>Tasa</u>
1980-1982	581	11,21	336	12,46	245	9,86
1983-1985	488	10,84	280	12,01	208	9,58
1986-1988	378	8,96	222	10,12	156	7,71
1989-1991	357	8,53	208	9,66	149	7,33
1992-1994	309	7,77	168	8,11	141	7,39
1995-1997	283	7,38	153	7,74	130	7,00

**2.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	581	11,21	488	10,84	378	8,96	357	8,53	309	7,77	283	7,38
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,04	2	0,04	4	0,09	1	0,02	1	0,03	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,03	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,04	2	0,04	4	0,09	1	0,02	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	3	0,07	-	-	1	0,03	2	0,05
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	1	0,02	2	0,05	-	-	1	0,03	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	1	0,02	1	0,02	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,03	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	1	0,02	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	-	-	1	0,03
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,04	-	-	1	0,02	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	1	0,02	-	-	1	0,02	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	2	0,04	2	0,04	5	0,12	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	1	0,02	1	0,02	5	0,12	3	0,07	2	0,05	-	-
12. Asma	-	-	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	1	0,02	-	-	4	0,09	2	0,05	2	0,05	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	1	0,02	1	0,02	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	2	0,04	-	-	-	-	1	0,02	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	1	0,02	-	-	-	-	1	0,02	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	2	0,05	1	0,02	-	-	-	-

2.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	96	1,85	82	1,82	74	1,75	81	1,94	55	1,38	58	1,51
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	24	0,46	25	0,56	18	0,43	11	0,26	7	0,18	3	0,08
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	31	0,60	13	0,29	9	0,21	20	0,48	6	0,15	13	0,34
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	1	0,02	2	0,04	3	0,07	3	0,07	4	0,10	4	0,10
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,05	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,02	3	0,07	1	0,02	4	0,10	6	0,15	3	0,08
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,04	4	0,09	5	0,12	6	0,14	5	0,13	10	0,26
24. Anomalías cromosómicas	2	0,04	-	-	2	0,05	9	0,22	4	0,10	4	0,10
25. Anomalías congénitas múltiples	20	0,39	24	0,53	26	0,62	20	0,48	15	0,38	16	0,42
26. Resto de anomalías congénitas	15	0,29	11	0,24	10	0,24	8	0,19	6	0,15	5	0,13
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	472	9,11	396	8,79	278	6,59	269	6,43	246	6,18	221	5,76
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	20	0,39	12	0,27	3	0,07	3	0,07	17	0,43	14	0,36
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	145	2,80	129	2,86	100	2,37	84	2,01	58	1,46	58	1,51
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	55	1,06	32	0,71	23	0,55	21	0,50	21	0,53	12	0,31
30. Traumatismo al nacer	9	0,17	1	0,02	-	-	3	0,07	5	0,13	1	0,03
31. Hipoxia intrauterina y asfisia al nacer	43	0,83	42	0,93	40	0,95	21	0,50	25	0,63	15	0,39
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	43	0,83	26	0,58	19	0,45	34	0,81	15	0,38	18	0,47
33. Infecciones propias del periodo perinatal	15	0,29	13	0,29	3	0,07	2	0,05	7	0,18	7	0,18
34. Hemorragia perinatal	-	-	2	0,04	1	0,02	2	0,05	1	0,03	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	4	0,08	6	0,13	-	-	-	-	1	0,03	2	0,05
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	5	0,10	6	0,13	4	0,09	3	0,07	-	-	2	0,05
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	1	0,02	-	-	-	-	1	0,02	1	0,03	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	1	0,02	1	0,02	-	-	3	0,08	2	0,05
39. Resto de afecciones perinatales	132	2,55	126	2,80	84	1,99	95	2,27	92	2,31	90	2,35
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	11	0,21	13	0,29	10	0,24	4	0,10	4	0,10	4	0,10
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	1	0,02	3	0,07	-	-	1	0,02	-	-	-	-

**2.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3.Crecimiento fetal lento y desnutricion fetal	-	-	2	0,04	1	0,02	4	0,10	1	0,03	3	0,08
39.4.Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	-	-	1	0,02	-	-	-	-	2	0,05	-	-
39.5.Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6.Trastornos hematologicos del feto y del recién nacido	3	0,06	1	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7.Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	117	2,26	106	2,35	73	1,73	86	2,05	85	2,14	83	2,16
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	1	0,02	2	0,05	-	-	2	0,05	1	0,03
40.Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	2	0,05	-	-	1	0,03	-	-
41.Resto de causas mal definidas	-	-	1	0,02	-	-	-	-	1	0,03	1	0,03
XVII. Traumatismos y envenenamientos	3	0,06	2	0,04	1	0,02	-	-	1	0,03	-	-
42.Broncoaspiración por alimentos y vómitos	2	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.Resto de accidentes	1	0,02	2	0,04	1	0,02	-	-	1	0,03	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	336	12,46	280	12,01	222	10,12	208	9,66	168	8,11	153	7,74
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,04	1	0,04	3	0,14	1	0,05	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,04	1	0,04	3	0,14	1	0,05	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	1	0,05
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,04	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	1	0,04	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	2	0,07	2	0,09	3	0,14	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	1	0,04	-	-	3	0,14	2	0,09	1	0,05	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	1	0,04	-	-	3	0,14	1	0,05	1	0,05	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	2	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	59	2,19	40	1,72	43	1,96	48	2,23	28	1,35	39	1,97
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	9	0,33	9	0,39	8	0,36	8	0,37	3	0,14	1	0,05
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	25	0,93	7	0,30	5	0,23	11	0,51	3	0,14	9	0,46
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	1	0,04	1	0,04	2	0,09	2	0,09	3	0,14	3	0,15
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,04	1	0,04	1	0,05	3	0,14	4	0,19	2	0,10
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04	3	0,13	2	0,09	4	0,19	3	0,14	8	0,40
24. Anomalías cromosómicas	1	0,04	-	-	1	0,05	4	0,19	3	0,14	1	0,05
25. Anomalías congénitas múltiples	11	0,41	15	0,64	17	0,78	11	0,51	6	0,29	12	0,61
26. Resto de anomalías congénitas	10	0,37	4	0,17	7	0,32	5	0,23	3	0,14	3	0,15
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	268	9,93	235	10,08	163	7,43	156	7,24	135	6,52	113	5,71
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	12	0,44	9	0,39	2	0,09	3	0,14	10	0,48	8	0,40
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	89	3,30	82	3,52	53	2,42	50	2,32	29	1,40	31	1,57
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	29	1,08	20	0,86	16	0,73	14	0,65	13	0,63	3	0,15
30. Traumatismo al nacer	3	0,11	-	-	-	-	-	-	5	0,24	1	0,05
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	19	0,70	21	0,90	23	1,05	11	0,51	12	0,58	7	0,35
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	29	1,08	14	0,60	11	0,50	21	0,97	11	0,53	11	0,56
33. Infecciones propias del periodo perinatal	6	0,22	7	0,30	1	0,05	1	0,05	3	0,14	3	0,15
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,04	1	0,05	1	0,05	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	4	0,15	3	0,13	-	-	-	-	-	-	1	0,05
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	2	0,07	2	0,09	3	0,14	-	-	-	-	2	0,10
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	1	0,04	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	1	0,04	-	-	-	-	2	0,10	2	0,10
39. Resto de afecciones perinatales	74	2,74	75	3,22	53	2,42	54	2,51	49	2,37	44	2,22
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	7	0,26	8	0,34	5	0,23	4	0,19	1	0,05	3	0,15
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	2	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niños.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	-	-	1	0,04	1	0,05	2	0,09	1	0,05	-	-
39.4. Trastornos por mayor gestación y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,10	-	-
39.5. Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6. Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,04	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	66	2,45	63	2,70	47	2,14	48	2,23	45	2,17	41	2,07
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	-	-
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	-	-
41. Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	1	0,04	2	0,09	-	-	-	-	1	0,05	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	-	-	2	0,09	-	-	-	-	1	0,05	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	245	9,86	208	9,58	156	7,71	149	7,33	141	7,39	130	7
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,04	1	0,05	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,04	1	0,05	1	0,05	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-	1	0,05
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	1	0,05	1	0,05	-	-	-	-	1	0,05
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	-	-	2	0,10	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	1	0,05	2	0,10	1	0,05	1	0,05	-	-
12. Asma	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05	1	0,05	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	1	0,05	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	2	0,10	1	0,05	-	-	-	-

**2.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)**

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	37	1,49	42	1,93	31	1,53	33	1,62	27	1,42	19	1,02
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	15	0,60	16	0,74	10	0,49	3	0,15	4	0,21	2	0,11
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	6	0,24	6	0,28	4	0,20	9	0,44	3	0,16	4	0,22
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,10	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	2	0,09	-	-	1	0,05	2	0,10	1	0,05
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04	1	0,05	3	0,15	2	0,10	2	0,10	2	0,11
24. Anomalías cromosómicas	1	0,04	-	-	1	0,05	5	0,25	1	0,05	3	0,16
25. Anomalías congénitas múltiples	9	0,36	9	0,41	9	0,44	9	0,44	9	0,47	4	0,22
26. Resto de anomalías congénitas	5	0,20	7	0,32	3	0,15	3	0,15	3	0,16	2	0,11
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	204	8,21	161	7,41	115	5,68	113	5,56	111	5,82	108	5,81
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	8	0,32	3	0,14	1	0,05	-	-	7	0,37	6	0,32
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	56	2,25	47	2,16	47	2,32	34	1,67	29	1,52	27	1,45
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	26	1,05	12	0,55	7	0,35	7	0,34	8	0,42	9	0,48
30. Traumatismo al nacer	6	0,24	1	0,05	-	-	3	0,15	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	24	0,97	21	0,97	17	0,84	10	0,49	13	0,68	8	0,43
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	14	0,56	12	0,55	8	0,40	13	0,64	4	0,21	7	0,38
33. Infecciones propias del periodo perinatal	9	0,36	6	0,28	2	0,10	1	0,05	4	0,21	4	0,22
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,05	-	-	1	0,05	1	0,05	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	3	0,14	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	3	0,12	4	0,18	1	0,05	3	0,15	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	58	2,33	51	2,35	31	1,53	41	2,02	43	2,25	46	2,48
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	4	0,16	5	0,23	5	0,25	-	-	3	0,16	1	0,05
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	1	0,04	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-	-	-

**2.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Niñas.
(Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3.Crecimiento fetal lento y desnutricion fetal	-	-	1	0,05	-	-	2	0,10	-	-	3	0,16
39.4.Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5.Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6.Trastornos hematologicos del feto y del recién nacido	2	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7.Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	51	2,05	43	1,98	26	1,28	38	1,87	40	2,10	42	2,26
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	1	0,05	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05
40.Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.Resto de causas mal definidas	-	-	1	0,05	-	-	-	-	1	0,05	1	0,05
XVII. Traumatismos y envenenamientos	2	0,08	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
42.Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.Resto de accidentes	1	0,04	-	-	1	0,05	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 ÁREAS DE SALUD

Tendencias mortalidad infantil

3.1.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	126	17,65	93	13,03	78	10,93	15	2,10	33	4,62
1981	72	11,22	53	8,26	34	5,30	19	2,96	19	2,96
1982	98	15,21	64	9,93	36	5,59	28	4,35	34	5,28
1983	83	14,26	48	8,25	34	5,84	14	2,41	35	6,01
1984	74	12,83	52	9,01	31	5,37	21	3,64	22	3,81
1985	65	11,54	46	8,16	36	6,39	10	1,77	19	3,37
1986	55	10,06	34	6,22	27	4,94	7	1,28	21	3,84
1987	50	9,26	31	5,74	23	4,26	8	1,48	19	3,52
1988	54	9,79	42	7,61	25	4,53	17	3,08	12	2,18
1989	55	9,88	34	6,11	25	4,49	9	1,62	21	3,77
1990	51	9,22	33	5,97	18	3,26	15	2,71	18	3,26
1991	59	10,62	38	6,84	27	4,86	11	1,98	21	3,78
1992	57	10,24	40	7,19	25	4,49	15	2,69	17	3,05
1993	33	6,15	23	4,29	14	2,61	9	1,68	10	1,86
1994	43	8,52	36	7,13	29	5,74	7	1,39	7	1,39
1995	28	5,50	21	4,12	16	3,14	5	0,98	7	1,37
1996	33	6,63	25	5,02	17	3,42	8	1,61	8	1,61
1997	33	6,32	23	4,41	16	3,07	7	1,34	10	1,92

3.1.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	63	14,03	43	9,58	35	7,80	8	1,78	20	4,45
1981	31	7,41	18	4,30	15	3,59	3	0,72	13	3,11
1982	52	12,74	37	9,07	31	7,60	6	1,47	15	3,68
1983	25	6,21	17	4,22	14	3,48	3	0,75	8	1,99
1984	40	10,53	19	5,00	13	3,42	6	1,58	21	5,53
1985	25	6,75	15	4,05	10	2,70	5	1,35	10	2,70
1986	21	5,94	16	4,52	12	3,39	4	1,13	5	1,41
1987	18	5,00	12	3,33	7	1,94	5	1,39	6	1,67
1988	25	7,15	19	5,43	13	3,72	6	1,72	6	1,72
1989	20	5,69	9	2,56	5	1,42	4	1,14	11	3,13
1990	18	5,12	13	3,70	8	2,28	5	1,42	5	1,42
1991	26	7,75	19	5,66	17	5,07	2	0,60	7	2,09
1992	23	6,93	14	4,22	10	3,01	4	1,21	9	2,71
1993	21	6,51	14	4,34	11	3,41	3	0,93	7	2,17
1994	21	6,95	10	3,31	10	3,31	-	-	11	3,64
1995	14	4,53	7	2,26	6	1,94	1	0,32	7	2,26
1996	28	8,95	19	6,08	12	3,84	7	2,24	9	2,88
1997	13	4,04	5	1,55	5	1,55	-	-	8	2,48

3.1.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	32	15,53	20	9,71	14	6,80	6	2,91	12	5,83
1981	19	9,48	12	5,99	10	4,99	2	1,00	7	3,49
1982	13	7,15	5	2,75	4	2,20	1	0,55	8	4,40
1983	16	9,37	8	4,68	8	4,68	-	-	8	4,68
1984	8	4,71	4	2,35	4	2,35	-	-	4	2,35
1985	17	10,15	10	5,97	9	5,37	1	0,60	7	4,18
1986	11	7,14	8	5,19	6	3,90	2	1,30	3	1,95
1987	12	7,77	8	5,18	5	3,24	3	1,94	4	2,59
1988	12	8,12	8	5,42	7	4,74	1	0,68	4	2,71
1989	15	9,95	10	6,64	9	5,97	1	0,66	5	3,32
1990	8	5,44	5	3,40	5	3,40	-	-	3	2,04
1991	16	10,47	12	7,85	10	6,54	2	1,31	4	2,62
1992	17	11,60	12	8,19	11	7,51	1	0,68	5	3,41
1993	3	2,14	1	0,71	1	0,71	-	-	2	1,43
1994	10	7,12	7	4,98	6	4,27	1	0,71	3	2,14
1995	8	6,19	7	5,42	5	3,87	2	1,55	1	0,77
1996	11	7,87	7	5,01	6	4,29	1	0,72	4	2,86
1997	7	4,87	5	3,48	4	2,78	1	0,70	2	1,39

3.1.4. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	7	7,50	3	3,22	3	3,22	-	-	4	4,29
1981	8	8,61	6	6,46	2	2,15	4	4,31	2	2,15
1982	4	4,30	2	2,15	2	2,15	-	-	2	2,15
1983	9	10,84	8	9,64	6	7,23	2	2,41	1	1,20
1984	7	8,52	5	6,08	3	3,65	2	2,43	2	2,43
1985	4	4,95	2	2,48	2	2,48	-	-	2	2,48
1986	4	5,52	3	4,14	2	2,76	1	1,38	1	1,38
1987	6	7,78	2	2,59	2	2,59	-	-	4	5,19
1988	2	2,53	-	-	-	-	-	-	2	2,53
1989	7	9,45	4	5,40	3	4,05	1	1,35	3	4,05
1990	2	2,72	-	-	-	-	-	-	2	2,72
1991	7	9,19	2	2,62	1	1,31	1	1,31	5	6,56
1992	8	10,05	7	8,79	3	3,77	4	5,03	1	1,26
1993	7	9,59	3	4,11	2	2,74	1	1,37	4	5,48
1994	3	4,22	3	4,22	1	1,41	2	2,81	-	-
1995	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	4	5,43	4	5,43	2	2,71	2	2,71	-	-
1997	6	7,99	3	3,99	2	2,66	1	1,33	3	3,99

3.1.5. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	17	19,86	5	5,84	3	3,50	2	2,34	12	14,02
1981	8	10,51	6	7,88	5	6,57	1	1,31	2	2,63
1982	8	9,83	4	4,91	2	2,46	2	2,46	4	4,91
1983	11	16,54	8	12,03	6	9,02	2	3,01	3	4,51
1984	9	13,45	6	8,97	4	5,98	2	2,99	3	4,48
1985	7	10,99	5	7,85	2	3,14	3	4,71	2	3,14
1986	7	10,56	5	7,54	4	6,03	1	1,51	2	3,02
1987	6	9,58	2	3,19	2	3,19	-	-	4	6,39
1988	2	3,18	2	3,18	1	1,59	1	1,59	-	-
1989	8	12,68	4	6,34	1	1,58	3	4,75	4	6,34
1990	4	6,27	2	3,13	2	3,13	-	-	2	3,13
1991	8	12,66	7	11,08	5	7,91	2	3,16	1	1,58
1992	7	11,40	2	3,26	1	1,63	1	1,63	5	8,14
1993	6	9,49	4	6,33	3	4,75	1	1,58	2	3,16
1994	4	7,07	3	5,30	1	1,77	2	3,53	1	1,77
1995	3	4,87	1	1,62	1	1,62	-	-	2	3,25
1996	6	10,51	5	8,76	5	8,76	-	-	1	1,75
1997	6	10,58	4	7,05	3	5,29	1	1,76	2	3,53

3.1.6. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	18	6,60	9	3,30	7	2,57	2	0,73	9	3,30
1981	14	5,68	8	3,25	7	2,84	1	0,41	6	2,43
1982	11	4,42	7	2,81	5	2,01	2	0,80	4	1,61
1983	19	8,27	14	6,09	12	5,22	2	0,87	5	2,18
1984	9	4,28	5	2,38	5	2,38	-	-	4	1,90
1985	14	6,71	5	2,40	3	1,44	2	0,96	9	4,31
1986	11	5,43	7	3,46	5	2,47	2	0,99	4	1,98
1987	8	3,89	4	1,94	2	0,97	2	0,97	4	1,94
1988	11	5,32	4	1,93	2	0,97	2	0,97	7	3,38
1989	14	6,90	10	4,93	7	3,45	3	1,48	4	1,97
1990	12	6,05	7	3,53	6	3,03	1	0,50	5	2,52
1991	10	5,10	6	3,06	3	1,53	3	1,53	4	2,04
1992	15	7,46	10	4,97	7	3,48	3	1,49	5	2,49
1993	9	4,51	4	2,01	3	1,50	1	0,50	5	2,51
1994	10	5,74	5	2,87	4	2,30	1	0,57	5	2,87
1995	9	5,04	4	2,24	4	2,24	-	-	5	2,80
1996	16	8,70	11	5,98	7	3,81	4	2,18	5	2,72
1997	15	8,40	11	6,16	9	5,04	2	1,12	4	2,24

3.2.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	296	14,80	210	10,50	148	7,40	62	3,10	86	4,30
1983-1985	222	12,89	146	8,48	101	4,58	45	2,61	76	4,41
1986-1988	159	9,71	107	6,53	75	5,86	32	1,95	52	3,17
1989-1991	165	9,91	105	6,31	70	4,20	35	2,10	60	3,60
1992-1994	133	8,32	99	6,20	68	4,26	31	1,94	34	2,13
1995-1997	94	6,15	69	4,51	49	3,20	20	1,31	25	1,64

3.2.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	146	11,45	98	7,68	81	6,35	17	1,33	48	3,76
1983-1985	90	7,81	51	4,42	37	3,01	14	1,21	39	3,38
1986-1988	64	6,02	47	4,42	32	3,21	15	1,41	17	1,60
1989-1991	64	6,16	41	3,95	30	2,89	11	1,06	23	2,21
1992-1994	65	6,79	38	3,97	31	3,24	7	0,73	27	2,82
1995-1997	55	5,83	31	3,28	23	2,44	8	0,85	24	2,54

3.2.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	64	10,88	37	6,29	28	4,76	9	1,53	27	4,59
1983-1985	41	8,07	22	4,33	21	3,95	1	0,20	19	3,74
1986-1988	35	7,67	24	5,26	18	4,13	6	1,32	11	2,41
1989-1991	39	8,66	27	5,99	24	5,33	3	0,67	12	2,66
1992-1994	30	7,02	20	4,68	18	4,21	2	0,47	10	2,34
1995-1997	26	6,30	19	4,60	15	3,63	4	0,97	7	1,70

3.2.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	19	6,80	11	3,94	7	2,51	4	1,43	8	2,86
1983-1985	20	8,13	15	6,10	11	1,75	4	1,63	5	2,03
1986-1988	12	5,25	5	2,19	4	4,47	1	0,44	7	3,06
1989-1991	16	7,15	6	2,68	4	1,79	2	0,89	10	4,47
1992-1994	18	8,05	13	5,81	6	2,68	7	3,13	5	2,24
1995-1997	10	4,59	7	3,22	4	1,84	3	1,38	3	1,38

3.2.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	33	13,57	15	6,17	10	4,11	5	2,06	18	7,40
1983-1985	27	13,70	19	9,64	12	3,65	7	3,55	8	4,06
1986-1988	15	7,82	9	4,69	7	6,09	2	1,04	6	3,13
1989-1991	20	10,52	13	6,84	8	4,21	5	2,63	7	3,68
1992-1994	17	9,38	9	4,97	5	2,76	4	2,21	8	4,42
1995-1997	15	8,55	10	5,70	9	5,13	1	0,57	5	2,85

3.2.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil		Mortalidad neonatal		Mort. neonatal precoz		Mort. neonatal tardía		Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	43	5,60	24	3,13	19	2,47	5	0,65	19	2,47
1983-1985	42	6,47	24	3,70	20	1,46	4	0,62	18	2,77
1986-1988	30	4,88	15	2,44	9	3,08	6	0,98	15	2,44
1989-1991	36	6,03	23	3,85	16	2,68	7	1,17	13	2,18
1992-1994	34	5,92	19	3,31	14	2,44	5	0,87	15	2,61
1995-1997	40	7,39	26	4,81	20	3,70	6	1,11	14	2,59

3.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	296	14,80	222	12,89	159	9,71	165	9,91	133	8,32	94	6,15
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	5	0,25	12	0,70	4	0,24	5	0,30	2	0,13	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	1	0,05	5	0,29	1	0,06	1	0,06	1	0,06	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,20	6	0,35	3	0,18	4	0,24	1	0,06	-	-
II. Tumores	4	0,20	3	0,17	4	0,24	-	-	2	0,13	2	0,13
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	3	0,15	3	0,17	4	0,24	2	0,12	5	0,31	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	1	0,06	1	0,06	1	0,06	2	0,13	-	-
6. Fibrosis quística	2	0,10	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	1	0,06	2	0,13	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	1	0,05	1	0,06	3	0,18	-	-	1	0,06	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,10	1	0,06	1	0,06	1	0,06	-	-	1	0,07
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8	0,40	6	0,35	6	0,37	1	0,06	2	0,13	-	-
9. Meningitis	4	0,20	2	0,12	2	0,12	-	-	1	0,06	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	2	0,12	1	0,06	1	0,06	1	0,06	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	4	0,20	2	0,12	3	0,18	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	6	0,30	13	0,75	11	0,67	4	0,24	2	0,13	3	0,20
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	17	0,85	7	0,41	12	0,73	5	0,30	2	0,13	1	0,07
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	12	0,60	4	0,23	6	0,37	1	0,06	2	0,13	1	0,07
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	5	0,25	3	0,17	6	0,37	4	0,24	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	5	0,25	3	0,17	6	0,37	3	0,18	1	0,06	1	0,07
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	4	0,20	3	0,17	6	0,37	3	0,18	1	0,06	1	0,07
X. Enfermedades del aparato genitourinario	1	0,05	-	-	2	0,12	1	0,06	1	0,06	-	-

3.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	88	4,40	75	4,35	55	3,36	57	3,42	40	2,50	45	2,94
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	13	0,65	16	0,93	7	0,43	7	0,42	5	0,31	2	0,13
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	39	1,95	28	1,63	21	1,28	25	1,50	13	0,81	17	1,11
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	4	0,20	5	0,29	5	0,31	4	0,24	3	0,19	2	0,13
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	3	0,15	1	0,06	2	0,12	1	0,06	2	0,13	2	0,13
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	2	0,12	-	-	-	-	1	0,06	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,10	2	0,12	5	0,31	4	0,24	3	0,19	6	0,39
24. Anomalías cromosómicas	5	0,25	1	0,06	3	0,18	5	0,30	4	0,25	5	0,33
25. Anomalías congénitas múltiples	7	0,35	12	0,70	6	0,37	9	0,54	7	0,44	8	0,52
26. Resto de anomalías congénitas	15	0,75	8	0,46	6	0,37	2	0,12	2	0,13	3	0,20
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	141	7,05	89	5,17	47	2,87	71	4,26	67	4,19	41	2,68
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	4	0,20	5	0,29	1	0,06	1	0,06	5	0,31	3	0,20
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	8	0,40	2	0,12	-	-	3	0,18	1	0,06	-	-
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	49	2,45	26	1,51	9	0,55	7	0,42	13	0,81	4	0,26
30. Traumatismo al nacer	6	0,30	-	-	-	-	6	0,36	6	0,38	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	6	0,30	5	0,29	6	0,37	9	0,54	6	0,38	6	0,39
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	32	1,60	15	0,87	18	1,10	27	1,62	12	0,75	11	0,72
33. Infecciones propias del periodo perinatal	12	0,60	17	0,99	5	0,31	5	0,30	4	0,25	9	0,59
34. Hemorragia perinatal	-	-	2	0,12	1	0,06	2	0,12	2	0,13	1	0,07
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	3	0,17	-	-	-	-	1	0,06	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	1	0,05	-	-	-	-	-	-	1	0,06	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	3	0,15	-	-	1	0,06	2	0,12	5	0,31	1	0,07
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	1	0,06	-	-	1	0,06	1	0,07
39. Resto de afecciones perinatales	20	1,00	14	0,81	5	0,31	9	0,54	10	0,63	5	0,33
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	5	0,25	5	0,29	6	0,37	12	0,72	8	0,50	-	-
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	4	0,20	1	0,06	6	0,37	9	0,54	2	0,13	-	-

3.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	1	0,05	4	0,23	-	-	3	0,18	6	0,38	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	11	0,55	5	0,29	1	0,06	3	0,18	1	0,06	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	5	0,25	3	0,17	-	-	3	0,18	1	0,06	-	-
43. Resto de accidentes	6	0,30	2	0,12	1	0,06	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	146	11,45	90	7,81	64	6,02	64	6,16	65	6,79	55	5,83
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	0,55	6	0,52	4	0,38	2	0,19	1	0,10	1	0,11
1. Enfermedades infecciosas intestinales	4	0,31	2	0,17	1	0,09	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	1	0,08	2	0,17	-	-	1	0,10	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,16	2	0,17	3	0,28	1	0,10	1	0,10	1	0,11
II. Tumores	2	0,16	-	-	1	0,09	-	-	-	-	1	0,11
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	3	0,24	1	0,09	-	-	1	0,10	2	0,21	1	0,11
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	1	0,09	-	-	1	0,10	1	0,10	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	3	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08	1	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4	0,31	3	0,26	2	0,19	3	0,29	3	0,31	1	0,11
9. Meningitis	1	0,08	1	0,09	-	-	1	0,10	1	0,10	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	1	0,09	1	0,09	-	-	1	0,10	1	0,11
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	3	0,24	1	0,09	1	0,09	2	0,19	1	0,10	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	3	0,24	3	0,26	6	0,56	2	0,19	1	0,10	1	0,11
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	9	0,71	7	0,61	1	0,09	3	0,29	4	0,42	4	0,42
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	4	0,31	4	0,35	-	-	3	0,29	4	0,42	3	0,32
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	5	0,39	3	0,26	1	0,09	-	-	-	-	1	0,11
IX. Enfermedades del aparato digestivo	1	0,08	1	0,09	-	-	1	0,10	-	-	2	0,21
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	1	0,08	1	0,09	-	-	1	0,10	-	-	1	0,11
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	3	0,28	-	-	-	-	1	0,11

3.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	39	3,06	30	2,60	25	2,35	21	2,02	23	2,40	19	2,01
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	5	0,39	9	0,78	3	0,28	3	0,29	3	0,31	1	0,11
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	23	1,80	7	0,61	10	0,94	12	1,16	7	0,73	10	1,06
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	1	0,08	1	0,09	1	0,09	-	-	2	0,21	1	0,11
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	1	0,09	-	-	-	-	2	0,21	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	1	0,09	-	-	2	0,21	1	0,11
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	2	0,17	-	-	-	-	1	0,10	-	-
24. Anomalías cromosómicas	2	0,16	3	0,26	1	0,09	1	0,10	3	0,31	3	0,32
25. Anomalías congénitas múltiples	5	0,39	5	0,43	5	0,47	5	0,48	3	0,31	3	0,32
26. Resto de anomalías congénitas	3	0,24	2	0,17	4	0,38	-	-	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	69	5,41	30	2,60	19	1,79	24	2,31	27	2,82	21	2,22
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	8	0,63	-	-	-	-	-	-	4	0,42	1	0,11
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	2	0,16	3	0,26	-	-	2	0,19	1	0,10	1	0,11
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	11	0,86	5	0,43	8	0,75	2	0,19	5	0,52	3	0,32
30. Traumatismo al nacer	3	0,24	-	-	-	-	2	0,19	2	0,21	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	9	0,71	5	0,43	5	0,47	1	0,10	3	0,31	2	0,21
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	13	1,02	11	0,95	3	0,28	10	0,96	8	0,84	4	0,42
33. Infecciones propias del periodo perinatal	3	0,24	-	-	1	0,09	-	-	1	0,10	2	0,21
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	2	0,19	1	0,10	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	1	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	1	0,08	-	-	1	0,09	-	-	-	-	1	0,11
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	3	0,32
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	18	1,41	6	0,52	1	0,09	4	0,39	2	0,21	3	0,32
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	3	0,24	6	0,52	2	0,19	3	0,29	3	0,31	1	0,11
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	2	0,16	3	0,26	2	0,19	3	0,29	3	0,31	-	-

3.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	1	0,08	3	0,26	-	-	-	-	-	-	1	0,11
XVII. Traumatismos y envenenamientos	5	0,39	2	0,17	1	0,09	4	0,39	1	0,10	2	0,21
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	4	0,31	1	0,09	-	-	1	0,10	-	-	1	0,11
43. Resto de accidentes	1	0,08	1	0,09	1	0,09	3	0,29	1	0,10	1	0,11
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	64	10,88	41	8,07	35	7,67	39	8,66	30	7,02	26	6,30
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,51	-	-	-	-	-	-	1	0,23	1	0,24
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,24
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,51	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
II. Tumores	-	-	1	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	2	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	1	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	1	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,17	-	-	1	0,22	1	0,22	-	-	2	0,48
9. Meningitis	1	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,48
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	1	0,22	1	0,22	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	2	0,34	1	0,20	4	0,88	2	0,44	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	4	0,68	6	1,18	-	-	1	0,22	1	0,23	-	-
12. Asma	-	-	1	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	1	0,22	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	4	0,68	5	0,98	-	-	-	-	1	0,23	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	1	0,22	2	0,47	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	1	0,22	1	0,23	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	20	3,40	11	2,16	15	3,29	14	3,11	8	1,87	10	2,42
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	2	0,34	-	-	-	-	1	0,22	-	-	1	0,24
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	12	2,04	8	1,57	5	1,10	5	1,11	3	0,70	5	1,21
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,22	2	0,47	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	1	0,17	2	0,39	1	0,22	1	0,22	1	0,23	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	2	0,44	-	-	2	0,48
24. Anomalías cromosómicas	2	0,34	-	-	2	0,44	1	0,22	1	0,23	-	-
25. Anomalías congénitas múltiples	1	0,17	1	0,20	4	0,88	3	0,67	1	0,23	2	0,48
26. Resto de anomalías congénitas	1	0,17	-	-	3	0,66	-	-	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	4,25	17	3,35	13	2,85	16	3,55	13	3,04	12	2,91
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	1	0,17	2	0,39	-	-	-	-	-	-	2	0,48
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	2	0,34	5	0,98	1	0,22	1	0,22	-	-	-	-
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	4	0,68	2	0,39	6	1,32	4	0,89	1	0,23	1	0,24
30. Traumatismo al nacer	2	0,34	-	-	-	-	1	0,22	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	2	0,34	1	0,20	2	0,44	1	0,22	3	0,70	-	-
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	4	0,68	2	0,39	1	0,22	5	1,11	2	0,47	5	1,21
33. Infecciones propias del periodo perinatal	4	0,68	-	-	-	-	-	-	1	0,23	1	0,24
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	2	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	4	0,68	5	0,98	3	0,66	4	0,89	6	1,40	3	0,73
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	2	0,34	1	0,20	2	0,44	2	0,44	3	0,70	1	0,24
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	1	0,17	1	0,20	2	0,44	1	0,22	2	0,47	1	0,24

3.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	1	0,17	-	-	-	-	1	0,22	1	0,23	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	7	1,19	2	0,39	-	-	2	0,44	2	0,47	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	2	0,34	1	0,20	-	-	-	-	1	0,23	-	-
43. Resto de accidentes	5	0,85	1	0,20	-	-	2	0,44	1	0,23	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	19	6,80	20	8,13	12	5,25	16	7,15	18	8,05	10	4,59
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	1	0,41	1	0,44	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	1	0,44	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	1	0,36	1	0,41	1	0,44	-	-	-	-	1	0,46
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	1	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,46
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	1	0,41	1	0,44	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	1	0,41	1	0,44	-	-	-	-	1	0,46
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	1	0,44	-	-	-	-	1	0,46
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	1	0,41	-	-	1	0,45	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	4	1,43	1	0,41	-	-	1	0,45	2	0,89	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	2	0,72	1	0,41	-	-	-	-	2	0,89	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	2	0,72	-	-	-	-	1	0,45	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	5	1,79	4	1,63	5	2,19	4	1,79	6	2,68	2	0,92
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	1	0,36	1	0,41	2	0,87	2	0,89	-	-	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	3	1,07	1	0,41	1	0,44	-	-	3	1,34	2	0,92
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Anomalías cromosómicas	1	0,36	-	-	1	0,44	-	-	-	-	-	-
25. Anomalías congénitas múltiples	-	-	2	0,81	1	0,44	-	-	1	0,45	-	-
26. Resto de anomalías congénitas	-	-	-	-	-	-	2	0,89	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	2,51	8	3,25	4	1,75	6	2,68	7	3,13	5	2,30
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	-	-	2	0,81	1	0,44	-	-	-	-	-	-
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	1	0,36	4	1,63	1	0,44	1	0,45	-	-	2	0,92
30. Traumatismo al nacer	2	0,72	1	0,41	-	-	1	0,45	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-	1	0,46
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	2	0,72	1	0,41	-	-	1	0,45	3	1,34	1	0,46
33. Infecciones propias del periodo perinatal	2	0,72	-	-	1	0,44	1	0,45	1	0,45	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,45	1	0,46
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	1	0,44	1	0,45	1	0,45	-	-
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	1	0,36	3	1,22	-	-	3	1,34	2	0,89	-	-
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	1	0,36	2	0,81	-	-	2	0,89	2	0,89	-	-

**3.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos.
 ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	-	-	1	0,41	-	-	1	0,45	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	1	0,36	-	-	-	-	1	0,45	1	0,45	1	0,46
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	1	0,36	-	-	-	-	1	0,45	1	0,45	1	0,46
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	33	13,57	27	13,70	15	7,82	20	10,52	17	9,38	15	8,55
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,82	-	-	-	-	1	0,53	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,41	-	-	-	-	1	0,53	-	-	-	-
II. Tumores	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	1	0,53	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	1	0,53	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	1	0,41	4	2,03	2	1,04	1	0,53	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	5	2,06	1	0,51	-	-	-	-	-	-	1	0,57
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	4	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,57
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	1	0,41	1	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	1	0,41	-	-	1	0,52	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	1	0,52	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	11	4,52	11	5,58	3	1,56	6	3,16	8	4,42	5	2,85
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	1	0,41	1	0,51	1	0,52	1	0,53	-	-	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	7	2,88	4	2,03	1	0,52	3	1,58	4	2,21	2	1,14
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	2	1,01	-	-	-	-	1	0,55	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	-	-	1	0,53	1	0,55	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	1	0,51	-	-	-	-	-	-	1	0,57
24. Anomalías cromosómicas	1	0,41	1	0,51	-	-	-	-	1	0,55	1	0,57
25. Anomalías congénitas múltiples	1	0,41	1	0,51	1	0,52	-	-	1	0,55	1	0,57
26. Resto de anomalías congénitas	1	0,41	1	0,51	-	-	1	0,53	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8	3,29	7	3,55	6	3,13	9	4,73	7	3,86	7	3,99
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	-	-	2	1,01	-	-	1	0,53	-	-	-	-
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	-	-	-	-	3	1,56	1	0,53	-	-	1	0,57
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	3	1,23	3	1,52	1	0,52	1	0,53	3	1,66	1	0,57
30. Traumatismo al nacer	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	-	-	-	-	-	-	1	0,53	-	-	1	0,57
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	2	0,82	1	0,51	1	0,52	2	1,05	1	0,55	3	1,71
33. Infecciones propias del periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	1	0,53	3	1,66	-	-
34. Hemorragia perinatal	2	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	2	1,05	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	-	-	1	0,51	1	0,52	-	-	-	-	1	0,57
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	2	0,82	1	0,51	2	1,04	2	1,05	1	0,55	1	0,57
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	2	0,82	1	0,51	1	0,52	2	1,05	1	0,55	1	0,57

**3.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos.
 ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)**

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	1	0,52	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	1	0,41	3	1,52	1	0,52	-	-	1	0,55	1	0,57
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	1	0,51	1	0,52	-	-	1	0,55	-	-
43. Resto de accidentes	1	0,41	2	1,01	-	-	-	-	-	-	1	0,57
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	43	5,60	42	6,47	30	4,88	36	6,03	34	5,92	40	7,39
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	1	0,15	-	-	1	0,17	2	0,35	1	0,18
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	1	0,15	-	-	1	0,17	1	0,17	1	0,18
II. Tumores	1	0,13	-	-	1	0,16	-	-	1	0,17	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	1	0,13	1	0,15	-	-	-	-	-	-	1	0,18
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	1	0,15	-	-	-	-	2	0,35	1	0,18
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	1	0,15	-	-	-	-	2	0,35	1	0,18
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	4	0,52	3	0,46	5	0,81	2	0,34	1	0,17	1	0,18
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	1	0,13	3	0,46	-	-	4	0,67	1	0,17	1	0,18
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	1	0,15	-	-	2	0,34	-	-	1	0,18
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	1	0,13	2	0,31	-	-	2	0,34	1	0,17	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	2	0,33	-	-	-	-	1	0,18

3.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	19	2,47	12	1,85	12	1,95	14	2,35	12	2,09	19	3,51
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	5	0,65	2	0,31	1	0,16	2	0,34	-	-	3	0,55
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	9	1,17	5	0,77	5	0,81	2	0,34	3	0,52	7	1,29
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	1	0,15	1	0,16	2	0,34	-	-	1	0,18
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	1	0,13	2	0,31	-	-	1	0,17	-	-	1	0,18
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	-	-	1	0,17	1	0,17	1	0,18
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	1	0,16	-	-	1	0,17	1	0,18
24. Anomalías cromosómicas	1	0,13	2	0,31	2	0,33	3	0,50	1	0,17	2	0,37
25. Anomalías congénitas múltiples	2	0,26	-	-	1	0,16	3	0,50	5	0,87	3	0,55
26. Resto de anomalías congénitas	1	0,13	-	-	1	0,16	-	-	1	0,17	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	13	1,69	19	2,93	8	1,30	12	2,01	11	1,91	13	2,40
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,35	-	-
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	1	0,13	-	-	-	-	1	0,17	-	-	-	-
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,26	2	0,31	4	0,65	1	0,17	-	-	1	0,18
30. Traumatismo al nacer	-	-	-	-	-	-	1	0,17	1	0,17	1	0,18
31. Hipoxia intrauterina y asfisia al nacer	1	0,13	1	0,15	1	0,16	1	0,17	4	0,70	3	0,55
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	-	-	3	0,46	3	0,49	4	0,67	-	-	4	0,74
33. Infecciones propias del periodo perinatal	3	0,39	2	0,31	-	-	2	0,34	3	0,52	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	2	0,34	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
39. Resto de afecciones perinatales	5	0,65	10	1,54	-	-	-	-	1	0,17	3	0,55
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	1	0,13	1	0,15	1	0,16	1	0,17	3	0,52	2	0,37
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	1	0,16	-	-	3	0,52	2	0,37

3.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad infantil según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
41. Resto de causas mal definidas	1	0,13	1	0,15	-	-	1	0,17	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	3	0,39	-	-	1	0,16	1	0,17	1	0,17	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	3	0,39	-	-	1	0,16	1	0,17	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 **ÁREAS DE SALUD** **Tendencias mortalidad perinatal**

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal por área de salud. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	Área I		Área II		Área III		Área IV		Área V		Área VI	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980	125	17,39	68	15,03	31	14,93	6	6,41	8	9,29	16	5,85
1981	73	11,31	38	9,04	21	10,42	6	6,43	10	13,05	18	7,27
1982	62	9,58	66	16,03	9	4,94	7	7,48	8	9,76	9	3,61
1983	61	10,43	41	10,12	19	11,05	8	9,62	8	11,99	20	8,67
1984	72	12,39	56	14,58	8	4,70	8	9,67	9	13,35	13	6,15
1985	70	12,35	52	13,88	18	10,69	4	4,94	5	7,81	16	7,62
1986	69	12,52	30	8,44	12	7,76	5	6,87	8	11,99	16	7,86
1987	47	8,67	27	7,46	14	9,01	3	3,89	7	11,09	10	4,84
1988	58	10,45	30	8,53	24	16,06	3	3,78	8	12,60	7	3,38
1989	53	9,47	10	2,84	17	11,22	5	6,73	5	7,87	18	8,83
1990	54	9,7	20	5,67	19	12,80	2	2,72	6	9,35	15	7,53
1991	55	9,85	36	10,67	21	13,65	3	3,93	7	11,04	11	5,59
1992	58	10,36	25	7,50	14	9,54	3	3,77	3	4,87	17	8,41
1993	42	7,79	19	5,87	9	6,39	4	5,46	5	7,89	5	2,51
1994	56	11,03	23	7,58	12	8,50	2	2,81	5	8,77	7	4,01
1995	36	7,04	16	5,16	15	11,52	2	2,89	5	8,06	12	6,69
1996	40	8,00	24	7,65	9	6,42	5	6,76	9	15,65	12	6,51
1997	38	7,25	14	4,34	15	10,36	4	5,31	5	8,79	22	12,20

4.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal por área de salud. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	Área I		Área II		Área III		Área IV		Área V		Área VI	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
1980-1982	260	12,93	172	13,39	61	10,31	19	6,77	26	10,63	43	5,58
1983-1985	203	11,72	149	12,80	45	8,81	20	8,10	22	11,11	49	7,52
1986-1988	174	10,56	87	8,14	50	10,88	11	4,80	23	11,90	33	5,34
1989-1991	162	9,68	66	6,33	57	12,56	10	4,46	18	9,42	44	7,34
1992-1994	156	9,71	67	6,98	35	8,16	9	4,02	13	7,14	29	5,03
1995-1997	114	7,42	54	5,70	39	9,40	11	5,04	19	10,77	46	8,46

4.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	260	12,93	203	11,72	174	10,56	162	9,68	156	9,71	114	7,42
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	1	0,06	2	0,12	1	0,06	1	0,06	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,06	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	1	0,06	2	0,12	1	0,06	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	2	0,12	-	-	1	0,06	1	0,07
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	1	0,06	2	0,12	-	-	1	0,06	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	1	0,06	1	0,06	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,06	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	1	0,06	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	1	0,06	1	0,06	-	-	-	-	1	0,07
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	1	0,05	2	0,12	3	0,18	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	1	0,05	-	-	5	0,30	-	-	1	0,06	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	1	0,05	-	-	4	0,24	-	-	1	0,06	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	1	0,06	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	1	0,06	1	0,06	-	-	-	-

4.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	50	2,49	39	2,25	40	2,43	35	2,09	29	1,80	26	1,69
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	12	0,60	10	0,58	10	0,61	4	0,24	5	0,31	1	0,07
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	16	0,80	7	0,40	6	0,36	9	0,54	3	0,19	4	0,26
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	1	0,05	1	0,06	2	0,12	1	0,06	2	0,12	2	0,13
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,12	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	2	0,12	-	-	1	0,06	2	0,12	1	0,07
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,10	2	0,12	5	0,30	4	0,24	3	0,19	6	0,39
24. Anomalías cromosómicas	2	0,10	-	-	1	0,06	5	0,30	2	0,12	1	0,07
25. Anomalías congénitas múltiples	8	0,40	12	0,69	11	0,67	9	0,54	7	0,44	8	0,52
26. Resto de anomalías congénitas	9	0,45	5	0,29	5	0,30	2	0,12	3	0,19	3	0,20
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	205	10,19	158	9,12	116	7,04	125	7,47	122	7,59	86	5,60
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	5	0,25	5	0,29	2	0,12	2	0,12	9	0,56	5	0,33
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	64	3,18	42	2,42	42	2,55	41	2,45	33	2,05	19	1,24
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	37	1,84	17	0,98	5	0,30	7	0,42	12	0,75	4	0,26
30. Traumatismo al nacer	2	0,10	-	-	-	-	1	0,06	3	0,19	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfisia al nacer	12	0,60	11	0,63	17	1,03	11	0,66	10	0,62	5	0,33
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	25	1,24	12	0,69	13	0,79	16	0,96	6	0,37	7	0,46
33. Infecciones propias del periodo perinatal	7	0,35	11	0,63	1	0,06	-	-	1	0,06	6	0,39
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,06	1	0,06	2	0,12	1	0,06	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	1	0,05	4	0,23	-	-	-	-	1	0,06	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	2	0,10	-	-	1	0,06	2	0,12	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	1	0,05	-	-	-	-	1	0,06	1	0,06	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	1	0,06	1	0,06	-	-	3	0,19	1	0,07
39. Resto de afecciones perinatales	49	2,44	54	3,12	33	2,00	42	2,51	42	2,61	39	2,54
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	2	0,10	2	0,12	4	0,24	1	0,06	-	-	3	0,20
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	1	0,06	-	-	1	0,06	-	-	-	-

4.3.1. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3.Crecimiento fetal lento y desnutricion fetal	-	-	1	0,06	-	-	2	0,12	-	-	-	-
39.4.Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	-	-	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5.Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6.Trastornos hematologicos del feto y del recién nacido	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7.Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	46	2,29	49	2,83	29	1,76	38	2,27	42	2,61	36	2,34
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	2	0,12	-	-	1	0,06	-	-
40.Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	2	0,12	-	-	1	0,06	-	-
41.Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	2	0,10	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
42.Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.Resto de accidentes	1	0,05	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	172	13,39	149	12,80	87	8,14	66	6,33	67	6,98	54	5,70
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	1	0,09	2	0,19	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	1	0,09	2	0,19	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,08	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	1	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	1	0,08	-	-	-	-	1	0,10	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	1	0,08	-	-	-	-	1	0,10	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-

4.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	21	1,64	19	1,63	19	1,78	14	1,34	9	0,94	12	1,27
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	3	0,23	10	0,86	5	0,47	4	0,38	2	0,21	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	6	0,47	-	-	3	0,28	4	0,38	-	-	2	0,21
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	1	0,09	-	-	2	0,21	1	0,11
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	2	0,17	-	-	-	-	1	0,10	-	-
24. Anomalías cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,10	2	0,21
25. Anomalías congénitas múltiples	8	0,62	5	0,43	6	0,56	5	0,48	3	0,31	4	0,42
26. Resto de anomalías congénitas	4	0,31	2	0,17	4	0,37	1	0,10	-	-	2	0,21
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	146	11,37	129	11,08	61	5,71	50	4,80	58	6,04	41	4,33
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	12	0,93	2	0,17	1	0,09	-	-	4	0,42	2	0,21
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	38	2,96	53	4,55	14	1,31	14	1,34	12	1,25	10	1,06
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	10	0,78	6	0,52	5	0,47	4	0,38	5	0,52	3	0,32
30. Traumatismo al nacer	4	0,31	-	-	-	-	1	0,10	2	0,21	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfisia al nacer	21	1,64	23	1,98	16	1,50	6	0,58	7	0,73	5	0,53
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	11	0,86	7	0,60	2	0,19	7	0,67	5	0,52	2	0,21
33. Infecciones propias del periodo perinatal	2	0,16	-	-	1	0,09	-	-	1	0,10	1	0,11
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	2	0,16	1	0,09	-	-	-	-	-	-	1	0,11
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	2	0,16	6	0,52	3	0,28	1	0,10	-	-	1	0,11
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	44	3,43	31	2,66	19	1,78	17	1,63	22	2,29	16	1,69
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	2	0,16	6	0,52	3	0,28	2	0,19	2	0,21	-	-
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	2	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.2. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	1	0,11
39.4. Trastornos por mayor gestación y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,21	-	-
39.5. Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6. Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,16	1	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	40	3,11	22	1,89	16	1,50	14	1,34	18	1,87	15	1,58
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
XVII. Traumatismos y envenenamientos	1	0,08	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	-	-	-	-	1	0,09	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	61	10,31	45	8,81	50	10,88	57	12,56	35	8,16	39	9,40
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	-	-	1	0,22	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	1	0,20	-	-	-	-	1	0,23	-	-
12. Asma	-	-	1	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	13	2,20	9	1,76	5	1,09	12	2,64	2	0,47	7	1,69
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	4	0,68	1	0,20	-	-	1	0,22	-	-	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	5	0,85	2	0,39	-	-	3	0,66	1	0,23	4	0,96
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,22	1	0,23	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	1	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	2	0,44	-	-	2	0,48
24. Anomalías cromosómicas	-	-	-	-	-	-	2	0,44	-	-	-	-
25. Anomalías congénitas múltiples	1	0,17	3	0,59	4	0,87	2	0,44	-	-	1	0,24
26. Resto de anomalías congénitas	2	0,34	3	0,59	1	0,22	1	0,22	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	48	8,12	35	6,85	44	9,58	45	9,92	30	7,00	32	7,71
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	2	0,34	2	0,39	-	-	-	-	-	-	5	1,20
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	19	3,21	10	1,96	16	3,48	12	2,64	8	1,87	14	3,37
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	4	0,68	2	0,39	6	1,31	5	1,10	1	0,23	1	0,24
30. Traumatismo al nacer	1	0,17	-	-	-	-	1	0,22	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	3	0,51	2	0,39	3	0,65	2	0,44	6	1,40	1	0,24
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	3	0,51	2	0,39	1	0,22	6	1,32	2	0,47	3	0,72
33. Infecciones propias del periodo perinatal	2	0,34	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	14	2,37	17	3,33	18	3,92	19	4,19	12	2,80	8	1,93
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	4	0,68	3	0,59	1	0,22	-	-	1	0,23	1	0,24
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.3. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3.Crecimiento fetal lento y desnutricion fetal	-	-	-	-	-	-	1	0,22	1	0,23	1	0,24
39.4.Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5.Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6.Trastornos hematologicos del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7.Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	10	1,69	14	2,74	17	3,70	18	3,97	10	2,33	6	1,45
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
40.Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
42.Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.Resto de accidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	19	6,77	20	8,10	11	4,80	10	4,46	9	4,02	11	5,04
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	2	0,71	4	1,62	-	-	3	1,34	3	1,34	1	0,46
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	1	0,36	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	1	0,36	-	-	-	-	1	0,45	1	0,45	1	0,46
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,45	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	1	0,41	-	-	-	-	1	0,45	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Anomalías cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Anomalías congénitas múltiples	-	-	2	0,81	-	-	2	0,89	-	-	-	-
26. Resto de anomalías congénitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	17	6,06	15	6,08	11	4,80	6	2,67	6	2,68	10	4,58
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,89	-	-
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	5	1,78	6	2,43	6	2,62	-	-	-	-	3	1,37
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	1	0,36	4	1,62	1	0,44	1	0,45	-	-	2	0,92
30. Traumatismo al nacer	1	0,36	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	1	0,36	-	-	1	0,44	1	0,45	-	-	1	0,46
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	2	0,71	1	0,41	-	-	-	-	1	0,45	-	-
33. Infecciones propias del periodo perinatal	1	0,36	-	-	1	0,44	1	0,45	1	0,45	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	6	2,14	3	1,22	2	0,87	3	1,34	2	0,89	4	1,83
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	-	-	1	0,41	1	0,44	-	-	-	-	-	-
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.4. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,46
39.4. Trastornos por mayor gestación y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5. Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6. Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el período perinatal	6	2,14	2	0,81	1	0,44	3	1,34	2	0,89	3	1,37
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Resto de causas mal definidas	-	-	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	26	10,63	22	11,11	23	11,90	18	9,42	13	7,14	19	10,77
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	3	1,23	6	3,03	4	2,07	6	3,14	1	0,55	3	1,70
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	1	0,41	1	0,50	1	0,52	1	0,52	-	-	-	-
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	1	0,41	2	1,01	-	-	-	-	-	-	1	0,57
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	-	-	1	0,52	-	-	-	-
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,57
24. Anomalías cromosómicas	-	-	-	-	-	-	1	0,52	-	-	1	0,57
25. Anomalías congénitas múltiples	1	0,41	1	0,50	3	1,55	-	-	-	-	-	-
26. Resto de anomalías congénitas	-	-	1	0,50	-	-	3	1,57	1	0,55	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	21	8,58	15	7,57	19	9,83	12	6,28	12	6,59	16	9,07
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	1	0,41	2	1,01	-	-	1	0,52	-	-	1	0,57
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	6	2,45	4	2,02	11	5,69	4	2,09	3	1,65	4	2,27
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,82	2	1,01	1	0,52	1	0,52	2	1,10	1	0,57
30. Traumatismo al nacer	1	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	3	1,23	1	0,50	-	-	-	-	-	-	1	0,57
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	2	0,82	1	0,50	1	0,52	2	1,05	1	0,55	2	1,13
33. Infecciones propias del periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,10	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Resto de afecciones perinatales	6	2,45	5	2,52	6	3,10	4	2,09	4	2,20	7	3,97
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	2	0,82	1	0,50	1	0,52	1	0,52	1	0,55	-	-
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.5. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3.Crecimiento fetal lento y desnutricion fetal	-	-	1	0,50	1	0,52	-	-	-	-	-	-
39.4.Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5.Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6.Trastornos hematologicos del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7.Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	4	1,63	3	1,51	4	2,07	3	1,57	3	1,65	7	3,97
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	-	-	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
42.Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.Resto de accidentes	-	-	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
TOTAL	43	5,58	49	7,52	33	5,34	44	7,34	29	5,03	46	8,46
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Infecciones meningocócicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
III. Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fibrosis quística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-	-	-
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Atrofia muscular espinal infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Enfermedades del aparato circulatorio	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-	-	-
12. Asma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Infecciones respiratorias agudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Neumonía y gripe	-	-	-	-	-	-	1	0,17	-	-	-	-
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Enfermedades del aparato genitourinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Continúa)

	1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalías congénitas	7	0,91	5	0,77	6	0,97	11	1,83	11	1,91	9	1,66
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	3	0,39	2	0,31	2	0,32	1	0,17	-	-	2	0,37
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	2	0,26	2	0,31	-	-	3	0,50	1	0,17	1	0,18
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	-	-	-	-	1	0,16	1	0,17	-	-	1	0,18
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	-	-	-	-	-	-	2	0,33	1	0,17	1	0,18
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,17	1	0,18
24. Anomalías cromosómicas	-	-	-	-	1	0,16	1	0,17	1	0,17	-	-
25. Anomalías congénitas múltiples	2	0,26	1	0,15	2	0,32	2	0,33	5	0,87	3	0,55
26. Resto de anomalías congénitas	-	-	-	-	-	-	1	0,17	2	0,35	-	-
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	35	4,54	44	6,75	27	4,37	31	5,17	18	3,12	36	6,62
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	-	-	1	0,15	-	-	-	-	2	0,35	1	0,18
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas.	13	1,69	14	2,15	11	1,78	13	2,17	2	0,35	8	1,47
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	1	0,13	1	0,15	5	0,81	3	0,50	1	0,17	1	0,18
30. Traumatismo al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	3	0,39	5	0,77	3	0,49	1	0,17	2	0,35	2	0,37
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	-	-	3	0,46	2	0,32	3	0,50	-	-	4	0,74
33. Infecciones propias del periodo perinatal	3	0,39	2	0,31	-	-	1	0,17	1	0,17	-	-
34. Hemorragia perinatal	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	1	0,13	1	0,15	-	-	-	-	-	-	1	0,18
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Trastornos tegumentarios y de la temperatura del feto/neonato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,18
39. Resto de afecciones perinatales	13	1,69	16	2,45	6	0,97	10	1,67	10	1,74	16	2,94
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.2. Feto/neonato afectado por otras complicaciones en el parto	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.6. Defunciones y tasas por trienios de la mortalidad perinatal según causa. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos). (Conclusión)

	<u>1980-1982</u>		<u>1983-1985</u>		<u>1986-1988</u>		<u>1989-1991</u>		<u>1992-1994</u>		<u>1995-1997</u>	
	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa	Defun.	Tasa
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.4. Trastornos por mayor gestación y peso elevado al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5. Otras formas de ictericia perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.6. Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	11	1,43	16	2,45	6	0,97	10	1,67	10	1,74	16	2,94
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Resto de causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Traumatismos y envenenamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Resto de accidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de grandes causas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 REGIÓN DE MURCIA

Periodo 1993-1997

5.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Defun.	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	60	0,94
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	48	0,75
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	30	0,47
25. Anomalías congénitas múltiples	27	0,42
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	21	0,33
39. Resto de afecciones perinatales	20	0,31
33. Infecciones propias del periodo perinatal	20	0,31
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	15	0,23
14. Neumonía y gripe	13	0,20
24. Anomalías cromosómicas	13	0,20
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	13	0,20

5.2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad neonatal	
	Defun.	Tasa
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	42	0,66
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	30	0,47
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	29	0,45
25. Anomalías congénitas múltiples	23	0,36
39. Resto de afecciones perinatales	18	0,28
33. Infecciones propias del periodo perinatal	17	0,27
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	16	0,25
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	15	0,23
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	13	0,20
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	7	0,11
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	7	0,11

5.3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad neonatal precoz	
	Defun.	Tasa
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	29	0,45
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	25	0,39
25. Anomalías congénitas múltiples	19	0,30
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	17	0,27
39. Resto de afecciones perinatales	17	0,27
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	15	0,23
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	14	0,22
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	13	0,20
33. Infecciones propias del periodo perinatal	12	0,19
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	6	0,09

**5.4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad neonatal tardía	
	Defun.	Tasa
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	13	0,20
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	13	0,20
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	7	0,11
33. Infecciones propias del periodo perinatal	5	0,08
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	4	0,06
25. Anomalías congénitas múltiples	4	0,06
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	2	0,03
24. Anomalías cromosómicas	2	0,03
14. Neumonía y gripe	2	0,03
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	2	0,03
34. Hemorragia perinatal	2	0,03
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	2	0,03

**5.5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Ambos sexos.
(Tasas por 1000 nacidos vivos)**

	Mortalidad posneonatal	
	Defun.	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	30	0,47
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	11	0,17
14. Neumonía y gripe	9	0,14
24. Anomalías cromosómicas	7	0,11
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	6	0,09
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	5	0,08
43. Resto de accidentes	5	0,08
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	4	0,06
25. Anomalías congénitas múltiples	4	0,06
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	4	0,06
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	4	0,06
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	4	0,06

5.6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	Mortalidad perinatal	
	Defun.	Tasa
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	132	2,06
28. Feto/neonato afectado con alt. de placenta, cordón y membranas	92	1,43
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	30	0,47
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	30	0,47
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	29	0,45
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	28	0,44
25. Anomalías congénitas múltiples	23	0,36
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	17	0,27
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	13	0,20
33. Infecciones propias del periodo perinatal	12	0,19

5.7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Ambos sexos. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)

	Mortalidad fetal tardía	
	Defun.	Tasa
39.7. Otras afecciones mal definidas que se originan en el periodo perinatal	115	1,79
28. Feto/neonato afectado con alt. de placenta, cordón y membranas	88	1,37
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	16	0,25
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	14	0,22
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionada con el embarazo actual	6	0,09
26. Resto de anomalías congénitas	6	0,09
25. Anomalías congénitas múltiples	4	0,06
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	3	0,05
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	3	0,05
39.6. Trastornos por mayor gestación y peso elevado al nacer	2	0,03
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	2	0,03

6 **ÁREAS DE SALUD** **Periodo 1993-1997**

6.1.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	24	0,93
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	21	0,82
25. Anomalías congénitas múltiples	15	0,58
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	11	0,43
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	11	0,43
39. Resto de afecciones perinatales	9	0,35
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	8	0,31
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	7	0,27
33. Infecciones propias del periodo perinatal	7	0,27
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	7	0,27

6.1.2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	15	0,96
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	10	0,64
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	7	0,45
25. Anomalías congénitas múltiples	6	0,38
14. Neumonía y gripe	6	0,38
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	5	0,32
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	4	0,25
39. Resto de afecciones perinatales	3	0,19
24. Anomalías cromosómicas	3	0,19
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	3	0,19
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	3	0,19
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	3	0,19

6.1.3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	7	1,01
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	6	0,87
39. Resto de afecciones perinatales	5	0,72
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	3	0,43
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,29
25. Anomalías congénitas múltiples	2	0,29
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	2	0,29
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,29
10. Atrofia muscular espinal infantil	2	0,29

6.1.4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	3	0,83
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	2	0,55
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,55
43. Resto de accidentes	2	0,55

6.1.5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	4	1,36
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	3	1,02
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	3	1,02
33. Infecciones propias del periodo perinatal	3	1,02
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	2	0,68
25. Anomalías congénitas múltiples	2	0,68

6.1.6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Ambos sexos. ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos)

	Mortalidad infantil	
	Casos	Tasa
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	9	0,98
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	6	0,66
25. Anomalías congénitas múltiples	5	0,55
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	4	0,44
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	3	0,33
39. Resto de afecciones perinatales	3	0,33
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	3	0,33
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	3	0,33
33. Infecciones propias del periodo perinatal	2	0,22
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,22
24. Anomalías cromosómicas	2	0,22

**6.2.1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
ÁREA DE SALUD I. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**

	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	59	2,29
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	37	1,44
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	14	0,54
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	14	0,54
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	13	0,51
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	13	0,51
25. Anomalías congénitas múltiples	11	0,43
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	7	0,27
33. Infecciones propias del periodo perinatal	7	0,27
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	7	0,27

**6.2.2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
ÁREA DE SALUD II. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**

	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	26	1,65
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	16	1,02
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	8	0,51
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	7	0,45
25. Anomalías congénitas múltiples	7	0,45
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	6	0,38
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	5	0,32
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	3	0,19
39.4. Trastornos por mayor gestacion y peso elevado al nacer	2	0,13
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	2	0,13
26. Resto de anomalías congénitas	2	0,13
24. Anomalías cromosómicas	2	0,13

**6.2.3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
ÁREA DE SALUD III. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**

	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	20	2,88
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	13	1,87
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	5	0,72
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	5	0,72
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	4	0,58
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	3	0,43
39.1. Feto/neonato afec. por enf. de la madre no relacionadas con el embarazo actual	2	0,29
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,29
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,29

**6.2.4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
 ÁREA DE SALUD IV. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**

	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	5	1,38
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	3	0,83
27. Feto/neonato afectado por enfermedad materna en embarazo	2	0,55
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,55

**6.2.5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
 ÁREA DE SALUD V. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**


	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	9	3,04
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	7	2,37
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	3	1,02
29. Trastornos por menor gestación y bajo peso al nacer	2	0,68
33. Infecciones propias del periodo perinatal	2	0,68

**6.2.6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Ambos sexos.
 ÁREA DE SALUD VI. (Tasas por 1000 nacidos vivos y muertos)**


	Mortalidad perinatal	
	Casos	Tasa
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el periodo perinatal	20	2,18
28. Feto/neonato con alt. de placenta, cordón o membranas	9	0,98
32. Dificultad respiratoria del feto/neonato	4	0,44
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	4	0,44
25. Anomalías congénitas múltiples	4	0,44
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	2	0,22
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	2	0,22
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	2	0,22

GRÁFICAS


1.- Evolución de las tasas de mortalidad perinatal por trienios y sexo. Región de Murcia. 1980-1997




2.- Evolución de las tasas de las principales causas de mortalidad perinatal por trienios. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997




3.- Evolución de las tasas de mortalidad perinatal por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997




4.- Evolución de las tasas de enfermedades perinatales por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997




5.- Evolución de las tasas de anomalías congénitas por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997




6.- Distribución (%) de la mortalidad perinatal por causas. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997




7.- Distribución (%) de la mortalidad fetal tardía por causas. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997




8.- Evolución de las tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal por trienios. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997




9.- Evolución de las tasas de mortalidad infantil por sexo y trienios. Región de Murcia. 1980-1997




10.- Evolución en el porcentaje de muertes infantiles causadas por anomalías congénitas y por afecciones originadas en el periodo perinatal. Ambos sexos. Región de Murcia. 1980-1997



11.- Evolución de las tasas de mortalidad infantil por áreas de salud y trienios. Ambos sexos. 1980-1997



12.- Evolución de las tasas de mortalidad infantil en la Región de Murcia y España por trienios. Ambos sexos. 1980-1997



ANEXOS

1.- Nacimientos por área de salud y tipo de nacido, por trienios. Ambos sexos. 1980-1997

	Nacimientos					
	1980-1982	1983-1985	1986-1988	1989-1991	1992-1994	1995-1997
REGIÓN DE MURCIA	51.825	45.038	42.166	41.856	39.781	38.362
Nacidos vivos	51.537	44.752	41.933	41.651	39.614	38.199
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	140	128	78	80	76	75
Nacidos que han vivido más de 24 horas	51.397	44.624	41.855	41.571	39.538	38.124
Nacidos muertos	288	286	233	205	167	163
ÁREA I	20.112	17.325	16.482	16.742	16.068	15.355
Nacidos vivos	20.000	17.223	16.383	16.650	15.980	15.290
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	54	52	34	31	33	28
Nacidos que han vivido más de 24 horas	19.946	17.171	16.349	16.619	15.947	15.262
Nacidos muertos	112	102	99	92	88	65
ÁREA II	12.844	11.638	10.690	10.424	9.603	9.471
Nacidos vivos	12.753	11.526	10.635	10.388	9.567	9.440
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	53	25	17	15	21	15
Nacidos que han vivido más de 24 horas	12.700	11.501	10.618	10.373	9.546	9.425
Nacidos muertos	91	112	55	36	36	31
ÁREA III	5.914	5.106	4.594	4.538	4.288	4.151
Nacidos vivos	5.881	5.082	4.562	4.505	4.271	4.127
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	17	16	13	15	9	13
Nacidos que han vivido más de 24 horas	5.864	5.066	4.549	4.490	4.262	4.114
Nacidos muertos	33	24	32	33	17	24
ÁREA IV	2.805	2.469	2.293	2.243	2.240	2.184
Nacidos vivos	2.793	2.460	2.286	2.237	2.237	2.177
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	3	9	3	2	2	3
Nacidos que han vivido más de 24 horas	2.790	2.451	2.283	2.235	2.235	2.174
Nacidos muertos	12	9	7	6	3	7
ÁREA V	2.447	1.981	1.933	1.911	1.820	1.764
Nacidos vivos	2.431	1.971	1.917	1.901	1.812	1.754
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	2	8	5	7	2	4
Nacidos que han vivido más de 24 horas	2.429	1.963	1.912	1.894	1.810	1.750
Nacidos muertos	16	10	16	10	8	10
ÁREA VI	7.703	6.519	6.174	5.998	5.762	5.437
Nacidos vivos	7.679	6.490	6.150	5.970	5.747	5.411
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	11	18	6	10	9	12
Nacidos que han vivido más de 24 horas	7.668	6.472	6.144	5.960	5.738	5.399
Nacidos muertos	24	29	24	28	15	26

2.- Nacimientos por área de salud y tipo de nacido. Ambos sexos. Periodo 1993-1997

	TOTAL	Nacidos vivos	Nacidos que han vivido menos de 24 h	Nacidos que han vivido más de 24 h	Nacidos muertos
REGIÓN DE MURCIA	64.310	64.043	120	63.923	267
Área I	25.824	25.704	50	25.654	120
Área II	15.742	15.690	29	15.661	52
Área III	6.971	6.933	17	6.916	38
Área IV	3.628	3.618	4	3.614	10
Área V	2.968	2.952	5	2.947	16
Área VI	9.177	9.146	15	9.131	31

3.- Defunciones de menores de un año por área de salud y edad, por trienios. Ambos sexos. 1980-1997

	Defunciones					
	1980-1982	1983-1985	1986-1988	1989-1991	1992-1994	1995-1997
REGIÓN DE MURCIA	601	442	315	340	297	240
Nacido muerto	288	286	233	205	167	163
Menores de 24 horas	146	134	78	80	76	75
De 1 a 6 días	147	68	67	72	66	45
De 7 a 27 días	102	75	62	63	56	42
De 28 días a menos de 1 año	206	165	108	125	99	78
ÁREA I	296	222	159	165	133	94
Nacido muerto	112	102	99	92	88	65
Menores de 24 horas	59	57	34	31	33	28
De 1 a 6 días	89	44	41	39	35	21
De 7 a 27 días	62	45	32	35	31	20
De 28 días a menos de 1 año	86	76	52	60	34	25
ÁREA II	146	90	64	64	65	55
Nacido muerto	91	112	55	36	36	31
Menores de 24 horas	53	26	17	15	21	15
De 1 a 6 días	28	11	15	15	10	8
De 7 a 27 días	17	14	15	11	7	8
De 28 días a menos de 1 año	48	39	17	23	27	24
ÁREA III	64	41	35	39	30	26
Nacido muerto	33	24	32	33	17	24
Menores de 24 horas	17	16	13	15	9	13
De 1 a 6 días	11	5	5	9	9	2
De 7 a 27 días	9	1	6	3	2	4
De 28 días a menos de 1 año	27	19	11	12	10	7
ÁREA IV	19	20	12	16	18	10
Nacido muerto	12	9	7	6	3	7
Menores de 24 horas	3	9	3	2	2	3
De 1 a 6 días	4	2	1	2	4	1
De 7 a 27 días	4	4	1	2	7	3
De 28 días a menos de 1 año	8	5	7	10	5	3
ÁREA V	33	27	15	20	17	15
Nacido muerto	16	10	16	10	8	10
Menores de 24 horas	3	8	5	7	2	4
De 1 a 6 días	7	4	2	1	3	5
De 7 a 27 días	5	7	2	5	4	1
De 28 días a menos de 1 año	18	8	6	7	8	5
ÁREA VI	43	42	30	36	34	40
Nacido muerto	24	29	24	28	15	26
Menores de 24 horas	11	18	6	10	9	12
De 1 a 6 días	8	2	3	6	5	8
De 7 a 27 días	5	4	6	7	5	6
De 28 días a menos de 1 año	19	18	15	13	15	14

Nota: Los nacidos muertos no se incluyen en el total

4.- Defunciones de menores de un año por edad y área de salud. Ambos sexos. Periodo 1993-1997

	Región de Murcia	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
Menores de un año	410	170	97	39	20	25	59
Nacido muerto	267	120	52	38	10	16	31
Menores de 24 horas	120	50	29	17	4	5	15
De 1 a 6 días	85	42	15	5	3	8	12
De 7 a 27 días	70	36	11	5	6	4	8
De 28 días a menos de 1 año	135	42	42	12	7	8	24

Nota: Los nacidos muertos no se incluyen en el total de menores de un año.

5.- Lista de códigos y de causas de muerte. (Continúa)

CAUSAS	CIE 9 (*) (códigos a tres y cuatro dígitos)
I. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	001-139
1. Enfermedades infecciosas intestinales	001-009
2. Infecciones meningocócicas	036
3. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	010-035, 037-139
II. NEOPLASIAS	140-239
III. ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN, DEL METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	240-279
4. Trastornos de las glándulas suprarrenales	255
5. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	270
6. Fibrosis quística	277.0
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	279.5
8. Resto de enfermedades endocrino-metabólicas-inmunitarias	240-254, 256-269, 271-276, 277.1.2.3.4.5.6.8.9, 278, 279.1.2.3.4.8.9
IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	280-289
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	320-389
9. Meningitis	320-322
10. Atrofia muscular espinal infantil	335.0
11. Resto enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos	323-334, 335.1.2.8.9, 336-389
VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	390-459
VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	460-519
12. Asma	493
13. Infecciones respiratorias agudas	460-465
14. Neumonía y gripe	480-487
15. Resto de enfermedades del aparato respiratorio	466, 470-478, 490-519
IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	520-579
16. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	560
17. Resto de enfermedades del aparato digestivo	520-558, 562-579
X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	580-629

5.- Lista de códigos y de causas de muerte. (Continúa)

CAUSAS	CIE 9 (*) (códigos a tres y cuatro dígitos)
XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	630-676
XIV. ANOMALÍAS CONGÉNITAS	740-759
18. Anomalías congénitas del sistema nervioso	740-742
19. Anomalías congénitas del aparato circulatorio	745-747
20. Anomalías congénitas del aparato respiratorio	748
21. Anomalías congénitas del aparato digestivo	749-751
22. Anomalías congénitas del aparato urinario	753
23. Anomalías congénitas del sistema osteomuscular	754-756
24. Anomalías cromosómicas	758
25. Anomalías congénitas múltiples	759.7
26. Resto de anomalías congénitas	743, 744, 752, 757, 759.0.1.2.3.4.5.6.8.9
XV. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	760-779
27. Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	761
28. Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	762
29. Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otras formas de bajo peso al nacer	765
30. Traumatismo del nacimiento	767
31. Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	768
32. Síndrome de dificultad respiratoria y otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	769-770
33. Infecciones propias del periodo perinatal	771
34. Hemorragia perinatal	772
35. Enfermedad hemolítica debida a isosensibilización	773
36. Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	775
37. Trastornos perinatales del aparato digestivo	777
38. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	778
39. Resto de afecciones perinatales	760, 763, 764, 766, 774, 776, 779
39.1. Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	760

5.- Lista de códigos y de causas de muerte. (Conclusión)

CAUSAS	CIE 9 (*) (códigos a tres y cuatro dígitos)
39.2. Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones en el parto	763
39.3. Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	764
39.4. Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	766
39.5. Otras formas de ictericia perinatal	774
39.6. Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	776
39.7. Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	779
XVI. SIGNOS, SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	780-799
40. Síndrome de la muerte súbita del lactante	798.0
41. Resto de causas mal definidas	780-797, 798.1.2.9, 799
XVII. TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	E800-E999
42. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	E911
43. Resto de muertes por causas externas.	E800-E910, E912-E99
RESTO DE GRANDES CAUSAS	290-319, 680-686, 690-698, 700-735

(*) Clasificación internacional de Enfermedades, 9ª revisión

6.- Boletín Estadístico de Defunción. (Conclusión)

Naturaleza, características y finalidad

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año determinado.

Legislación

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el **secreto estadístico** los datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

La Ley 4/1990 establece la **obligación de facilitar los datos** que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP):

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, **deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo** a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, **será sancionado** de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

NOTA: Este Boletín, una vez cumplimentado, deberá ser devuelto por el Registro Civil a la Delegación Provincial del INE. En caso de muerte violenta deberá acompañarse del correspondiente MNP-52 o enviar este último con posterioridad.

7.- Boletín Estadístico de Partos, Nacimientos y Abortos. (Continúa)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Estadística del Movimiento Natural de la Población

Boletín Estadístico de Parto

Nacimientos y abortos

Datos de la inscripción (A rellenar por el Encargado del Registro Civil)

Registro civil n° _____ Municipio de _____ Provincia de _____ Inscripción realizada el día del mes del año Libro (s) Tomo (s) Página (s) En caso de aborto, incorporado al legajo de abortos el día del mes del año

Los datos recogidos en el Cuestionario para la declaración de nacimiento del Registro Civil que también figuren en este boletín, serán transmitidos a los Ayuntamientos para dar de alta al recién nacido en el Padrón Municipal de Habitantes (artículo 79.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales)

7.- Boletín Estadístico de Partos, Nacimientos y Abortos. (Continúa)

Los datos de los apartados siguientes serán consignados por los padres, parientes o personas obligadas por la ley a declarar el parto, o en su defecto por el Encargado del Registro Civil. Señale, por favor, con una X el recuadro correspondiente. (Se ruega escribir con mayúsculas. No escriba en los espacios sombreados).

1. Datos del parto

		Fecha del parto: día <input type="text"/> mes <input type="text"/> año <input type="text"/>	
Municipio donde ocurrió el parto <input type="text"/>		<input type="text"/>	
Provincia <input type="text"/>		<input type="text"/>	
Nº de semanas cumplidas de gestación <input type="text"/>		<input type="text"/>	
Lugar del parto:	Domicilio particular <input type="checkbox"/> 1	¿El parto fué asistido por personal sanitario? (médico, comadrona, A.T.S.)	Si <input type="checkbox"/> 1
	Centro sanitario <input type="checkbox"/> 2		No <input type="checkbox"/> 2
	Otro lugar <input type="checkbox"/> 3		
Multiplicidad:		Sencillo <input type="checkbox"/> 1	
		Doble <input type="checkbox"/> 2	
		Triple <input type="checkbox"/> 3	
		Cuádruple o más <input type="checkbox"/> 4	
Maturidad:		A término <input type="checkbox"/> 1	
		Prematuro <input type="checkbox"/> 2	
Normalidad:		Normal <input type="checkbox"/> 1	
		Distócico (Con complicaciones) <input type="checkbox"/> 2	

2. Datos de la madre

Nombre <input type="text"/>	<input type="text"/>
1º Apellido <input type="text"/>	<input type="text"/>
2º Apellido <input type="text"/>	<input type="text"/>
D.N.I. <input type="text"/>	Fecha de nacimiento: día <input type="text"/> mes <input type="text"/> año <input type="text"/>
Profesión, oficio u ocupación principal* <input type="text"/>	<input type="text"/>
Nacionalidad <input type="text"/>	<input type="text"/>
Residencia** : Municipio o país si es en el extranjero <input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	<input type="text"/>
Domicilio: Calle/Plaza/Avda. etc. <input type="text"/>	nº <input type="text"/>
escalera <input type="text"/>	planta <input type="text"/>
puerta <input type="text"/>	
Número de hijos que ha tenido contando este parto <input type="text"/>	
¿Cuántos de ellos nacieron con vida? <input type="text"/>	
El hijo anterior a este parto nacido con vida, nació el día <input type="text"/> mes <input type="text"/> año <input type="text"/>	
¿Está casada? Si <input type="checkbox"/> 1	
No*** <input type="checkbox"/> 2	
¿Está casada en primeras nupcias? Si <input type="checkbox"/> 1	
No <input type="checkbox"/> 2	
Fecha del actual matrimonio: día <input type="text"/> mes <input type="text"/> año <input type="text"/>	

3. Datos del padre

Nombre <input type="text"/>	<input type="text"/>
1º Apellido <input type="text"/>	<input type="text"/>
2º Apellido <input type="text"/>	<input type="text"/>
D.N.I. <input type="text"/>	Fecha de nacimiento: día <input type="text"/> mes <input type="text"/> año <input type="text"/>
Profesión, oficio u ocupación principal* <input type="text"/>	<input type="text"/>
Nacionalidad <input type="text"/>	<input type="text"/>
Residencia** : Municipio o país si es en el extranjero <input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	<input type="text"/>
Domicilio: Calle/Plaza/Avda. etc. <input type="text"/>	nº <input type="text"/>
escalera <input type="text"/>	planta <input type="text"/>
puerta <input type="text"/>	

* Si es jubilado/a, retirado/a o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente.

** Si es residente en España, se indicará el municipio en el que figura empadronado/a o, de no conocerse éste, el de la última residencia. Si es residente en el extranjero, se indicará únicamente el país de residencia.

*** Si la respuesta a esta pregunta es NO, pasar al apartado 3 (Datos del padre).

7.- Boletín Estadístico de Partos, Nacimientos y Abortos. (Continúa)

4. Datos del nacimiento o del aborto (Se rellena un apartado por cada nacido vivo o muerto)

1. Datos del primer nacido

Nombre	_____	
1 ^{er} Apellido	_____	
2 ^o Apellido	_____	
Sexo	Varón _____	<input type="checkbox"/> 1
	Mujer _____	<input type="checkbox"/> 6
Nació	Vivo _____	<input type="checkbox"/> 1
	Muerto _____	<input type="checkbox"/> 2
Vivió más de 24 horas	Si _____	<input type="checkbox"/> 1
	No _____	<input type="checkbox"/> 2
Peso en gramos	_____	

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto _____

Causa del feto o del recién nacido _____

2. Datos del segundo nacido (en caso de parto múltiple)

Nombre	_____	
1 ^{er} Apellido	_____	
2 ^o Apellido	_____	
Sexo	Varón _____	<input type="checkbox"/> 1
	Mujer _____	<input type="checkbox"/> 6
Nació	Vivo _____	<input type="checkbox"/> 1
	Muerto _____	<input type="checkbox"/> 2
Vivió más de 24 horas	Si _____	<input type="checkbox"/> 1
	No _____	<input type="checkbox"/> 2
Peso en gramos	_____	

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto _____

Causa del feto o del recién nacido _____

3. Datos del tercer nacido (en caso de parto múltiple)

Nombre	_____	
1 ^{er} Apellido	_____	
2 ^o Apellido	_____	
Sexo	Varón _____	<input type="checkbox"/> 1
	Mujer _____	<input type="checkbox"/> 6
Nació	Vivo _____	<input type="checkbox"/> 1
	Muerto _____	<input type="checkbox"/> 2
Vivió más de 24 horas	Si _____	<input type="checkbox"/> 1
	No _____	<input type="checkbox"/> 2
Peso en gramos	_____	

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto _____

Causa del feto o del recién nacido _____

Sello del Registro Civil

Firma del declarante*

Firma del médico**

Médico colegiado con el n° _____

* Indíquese debajo de la firma, el parentesco con los nacidos

** Cuando se trate de un nacido muerto o fallecido antes de las 24 horas

NOTA: Si el número de nacidos, en el parto, es superior a tres se cumplimentará un segundo boletín con los datos de inscripción y los datos del cuarto, quinto, etc... nacido.

7.- Boletín Estadístico de Partos, Nacimientos y Abortos. (Conclusión)

Naturaleza, características y finalidad

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año determinado.

Legislación

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el **secreto estadístico**, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

La Ley 4/1990 establece la **obligación de facilitar los datos** que se solicitan para la elaboración de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria **deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo** a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, **será sancionado** de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).



8.- Áreas sanitarias y municipios.

ÁREA I (MURCIA)

Albudeite
 Alcantarilla
 Alhama de Murcia
 Beniel
 Campos del Río
 Librilla
 Mula
 Murcia
 Pliego
 Santomera

ÁREA II (CARTAGENA)

Alcázares (Los)
 Cartagena
 Fuente Álamo
 Mazarrón
 San Javier
 San Pedro del Pinatar
 Torre Pacheco
 Unión (La)

ÁREA III (LORCA)

Águilas
 Aledo
 Lorca
 Puerto Lumbreras
 Totana

ÁREA IV (NOROESTE)

Bullas
 Calasparra
 Caravaca de la Cruz
 Cehegín
 Moratalla

ÁREA V (ALTIPLANO)

Jumilla
 Yecla

ÁREA VI (VEGA DEL SEGURA - COMARCA ORIENTAL)

Abanilla
 Abarán
 Alguazas
 Archena
 Blanca
 Ceutí
 Cieza
 Fortuna
 Lorquí
 Molina de Segura
 Ojós
 Ricote
 Torres de Cotillas (Las)
 Ulea
 Villanueva del Río Segura

9.- Comparación de la mortalidad perinatal del Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca" de Murcia y la Estadística Oficial. (Continúa)

Exhaustividad de los boletines estadísticos de parto y defunción al comparar con el registro de admisiones del hospital materno infantil "Virgen de la Arrixaca" en las defunciones perinatales e infantiles de hijos de madres residentes en la Región de Murcia, 1991 y 1994

Introducción

En varias CC.AA, se ha puesto en evidencia la infradeclaración que existe en la mortalidad perinatal. En la Región de Murcia, con datos de 1996, observamos que el 38,8% de los boletines estadísticos de partos (BEP) correspondientes a mortinatos o fallecidos durante las primeras 24 horas de vida, se certifican con una causa de muerte mal definida o que no se menciona causa alguna. Es por ello, que hemos intentado hacer una aproximación a la exhaustividad de los boletines estadísticos en la mortalidad perinatal e infantil partiendo de la información disponible en el principal hospital materno-infantil de la Región de Murcia.

Material y métodos

El servicio de admisiones envía al Registro de Vacunaciones los siguientes datos de los nacidos muertos y fallecidos de menos de dos años en el hospital infantil V. de la Arrixaca: fecha de emisión del impreso, fecha de nacimiento, fecha de escritura del impreso, mes y año de la defunción, sexo, apellidos del fallecido, municipio y domicilio de residencia del padre/madre.

El servicio de admisiones ha remitido en 1991 (de enero a julio), y en 1994 (todo el año), un total de 49 y 53 defunciones, respectivamente.

Se han buscado dichos fallecimientos en los boletines estadísticos de parto (BEP que incluye a las muertes fetales tardías de más de 26 semanas de gestación y nacidos vivos que fallecen en las 24 horas de vida), y en los boletines estadísticos de defunción (BED, que incluyen a los nacidos vivos que fallecen después de las 24 horas de vida), utilizando el siguiente orden:

En los BEP: comprobamos la fecha del parto, 1er. apellido del padre, 1er. apellido de la madre, o los dos de la madre, municipio de residencia del padre/madre y sexo.

En los BED: comprobamos la fecha de nacimiento, apellidos del padre, y/o apellidos de la madre, municipio de residencia y sexo.

Para el año 1991, el período de búsqueda en los BEP es desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 30 de septiembre de 1991 (12 meses), en los BED desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 31 de mayo de 1992 (17 meses), y en el registro de mortalidad para el mismo periodo.

Para el año 1994, el período de búsqueda en BEP y en BED, abarca los fallecidos desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994,

Consideramos *Asimilable a BED*: cuando la diferencia de tiempo entre la fecha de emisión del impreso, encabezados de mes de defunción o fecha de pie de página del impreso y la fecha del parto, era de meses o semanas distintas. Y *asimilable a BEP*, cuando coincidan las fechas del impreso con la fecha de nacimiento, los apellidos y sexo, aunque no el nombre. Nos comenta el INE en Murcia que puede bautizarse 'in extremis' antes de las 24 horas de vida.

9.- Comparación de la mortalidad perinatal del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca" de Murcia y la Estadística Oficial. (Conclusión)

En todos los boletines localizados coincidía: día, mes y año de la fecha del parto y de defunción, el domicilio, los apellidos de los padres, con excepción de 2 boletines de parto: uno sin apellidos y otro un nombre que no concuerda con el sexo.

Resultados

Como indica la tabla 1, de los 49 y 53 impresos emitidos no han sido hallados el 18,4 % en 1991 y el 18,9% en 1994, de los boletines estadísticos, la mayoría de los cuales corresponde a boletines estadísticos de parto.

Tabla 1. Descripción de la búsqueda del hospital materno-infantil Virgen de la Arrixaca en los boletines estadísticos de parto y defunción.

	1991		1994	
	Nº boletines	%	Nº boletines	%
TOTAL	49	100,0	53	100,0
Boletines encontrados	40	81,6	42	9,2
Encontrados en BEP	10	20,4	14	26,4
Encontrados en BED	30	61,2	28	2,8
Boletines no encontrados	9	18,4	11	18,9
Asimilables a BEP	8	16,3	9	17,0
Asimilables a BED	-	-	1	1,9
Dudoso¹	1	2,0	1	1,9

(1) No reúne los criterios de los apartados anteriores.

Conclusión

Podemos concluir que existen sospechas fundamentadas de infradeclaración en la mortalidad de los boletines estadísticos de parto. Y que su magnitud parece ser importante (al menos del 18,4%), y que la calidad en la cumplimentación de las causas de muerte, en el BEP es muy baja (38,8 % sin causa o con entidades mal definidas).

Recomendación

- 1) Que los Registros civiles velen por la calidad de los datos y no se admita ningún BEP sin la causa defunción.
- 2) Recordar a los hospitales y clínicas materno-infantiles radicadas en la Región de Murcia, la obligación legal de declarar las defunciones de mortinatos con 180 días o más de gestación.