

### 13. Características de las comunidades biológicas.

Hectáreas

2000

	<b>Características de las comunidades biológicas</b>
<b>TOTAL</b>	57.170,0
<b>Algas fotófilas infralitorales de modo calmo</b>	694,3
<b>Arenas fangosas en modo calmo</b>	1.540,9
<b>Arenas finas bien calibradas</b>	2.248,3
<b>Arenas finas superficiales</b>	1,8
<b>Césped de Caulerpa prolifera</b>	12.648,7
<b>Césped de Cymodocea nodosa</b>	533,3
<b>Césped de Zostera noltii</b>	2,0
<b>Coralígeno o de algas esciáfilas circalitorales de modo calmo</b>	54,3
<b>Fondos blandos muy contaminados</b>	1.992,1
<b>Fondos detríticos costeros</b>	22.275,7
<b>Fondos detríticos enfangados</b>	3.519,3
<b>Guijarros infralitorales</b>	69,3
<b>Matas muertas de Posidonia oceanica</b>	67,3
<b>Pradera de Posidonia oceanica</b>	11.522,7

Nota: Datos actualizados cada 10 años.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Estadísticas Ambientales de la Región de Murcia