

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
HB	1.233	611	543	482	305		
Pentavalente	920	354	245	238	374	383	251
Hexavalente		661	797	741	932	782	841
VNC 13v							
TV	457	583	484	496	797	633	623
SRPV							
Men B							

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Men C	460	771	834	753	1.258	1.079	1.176
MEN ACWY							
Varicela				35	85	111	193
DTPa-VPI							
DTPa	227	255	199	209	342	300	234
VPH					618	428	354
Td	629	722	718	855	1.379	1.238	1.246

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
HZ/Su							
VNC 20 v							

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HB							
Pentavalente	297	277	258	252	232	99	
Hexavalente	730	737	740	721	705	713	1.002
VNC 13v					697	694	1.025
TV	603	779	827	547	455	476	657
SRPV							
Men B							

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Men C	1.073	1.008	873	726	689	708	957
MEN ACWY							
Varicela	329	231	1.010	114	302	431	536
DTPa-VPI							
DTPa	271	273	277	245	223	578	767
VPH	760	886	1.451	264	208	245	430
Td	986	1.663	891	685	606	374	248

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HZ/Su							
VNC 20 v							

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2019	2020	2021	2022	2023
HB					
Pentavalente					
Hexavalente	634	616	639	743	597
VNC 13v	672	636	680	738	654
TV	360	227	240	244	263
SRPV	203	215	249	198	204
Men B					499

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2019	2020	2021	2022	2023
Men C	462	407	428	294	200
MEN ACWY	281	310	1.305	654	587
Varicela	356	343	335	299	349
DTPa-VPI				76	206
DTPa	456	459	498	187	254
VPH	305	245	247	363	574
Td	405	353	342	324	448

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

10. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Alhama de Murcia

	2019	2020	2021	2022	2023
HZ/Su					194
VNC 20 v					128

Fecha de actualización: 13/09/2024.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DPTa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente