

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
HB	288	66	106	102	76		
Pentavalente	207	59	46	2	71	63	44
Hexavalente		113	173	135	142	117	148
VNC 13v							
TV	89	85	103	93	152	95	104
SRPV							
Men B							

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Men C	103	127	175	152	200	164	191
MEN ACWY							
Varicela				13	10	19	25
DTPa-VPI							
DTPa	37	36	42	30	72	50	53
VPH					119	47	79
Td	189	56	122	158	286	238	224

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
HZ/Su							
VNC 20 v							

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HB							
Pentavalente	50	41	33	43	31	21	
Hexavalente	107	94	132	86	105	119	131
VNC 13v					105	131	140
TV	100	154	106	90	63	73	84
SRPV							
Men B							

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPV: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Men C	157	154	151	117	90	118	150
MEN ACWY							
Varicela	20	18	169	29	47	53	75
DTPa-VPI							
DTPa	50	58	43	43	43	119	90
VPH	145	125	214	254	24	46	89
Td	183	347	197	157	145	95	161

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HZ/Su							
VNC 20 v							

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HB						
Pentavalente						
Hexavalente	88	82	103	109	74	90
VNC 13v	94	93	111	112	86	38
TV	40	46	41	40	32	35
SRPV	31	31	42	18	40	33
Men B					71	94

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Men C	60	58	64	38	29	22
MEN ACWY	47	2	327	94	72	47
Varicela	49	45	47	46	47	44
DTPa-VPI				16	39	23
DTPa	66	63	81	33	26	33
VPH	49	54	55	70	88	38
Td	238	313	67	67	61	54

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente

9. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

Vacunaciones - Pliego

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HZ/Su					30	45
VNC 20 v					28	117

Fecha de actualización: 12/11/2025.

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

VNC 13v: Vacuna Neumocócica conjugada 13 valente.

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

El 1 de enero de 2013 se adelanta el calendario para la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 6 a los 4 años. Así, la cifra del 2013 comprende a los nacidos en 2007 y 2009. A partir del 1 de enero de 2014 recibirán la segunda dosis de vacuna triple vírica los nacidos en 2008 y 2010.

SRPV: Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Men B: Vacuna frente al Meningococo Serogrupo B.

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

MEN ACWY: Meningococo ACWY

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

DTPa-VPI: Difteria (alta carga), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida), Polio inactivada

DTPa-VPI/dTpa: 2022: A los 6 años, los nacidos hasta el 30 de junio reciben una dosis de dTpa y los nacidos a partir del 1 de julio DTPa-VPI.

VPH: Virus del papiloma humano.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

HZ/Su: Vacuna frente a Herpes Zóster de subunidades.

VNC 20 v: Vacuna Neumocócica conjugada 20 valente