

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 20,57 | 0,27 | 114,43 | 154,57 | 49,81 | 360,72 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 76,32 | 8,57 | 275,54 | 111,55 | 12,53 | 402,74 |
| 4 Septicemia | 115,08 | 85,40 | 151,72 | 85,82 | 55,52 | 126,69 |
| 5 Hepatitis víricas | 79,19 | 28,92 | 172,37 | 133,96 | 53,67 | 276,03 |
| 6 SIDA | 86,27 | 39,37 | 163,79 | 127,21 | 58,05 | 241,51 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 125,14 | 77,43 | 191,30 | 65,71 | 28,29 | 129,49 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 80,42 | 41,51 | 140,49 | 156,57 | 91,15 | 250,70 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 71,94 | 49,81 | 100,53 | 137,23 | 100,09 | 183,63 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 99,77 | 80,71 | 121,96 | 92,56 | 70,79 | 118,90 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 78,73 | 49,32 | 119,21 | 122,30 | 78,33 | 181,98 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 131,02 | 96,59 | 173,71 | 78,27 | 47,79 | 120,89 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 81,52 | 32,66 | 167,97 | 134,75 | 58,02 | 265,52 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 103,74 | 76,49 | 137,55 | 106,27 | 74,01 | 147,80 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 106,94 | 61,09 | 173,68 | 74,57 | 32,11 | 146,95 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 105,90 | 91,70 | 121,68 | 105,66 | 88,94 | 124,61 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 143,52 | 52,41 | 312,40 | 106,08 | 21,32 | 309,95 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 104,13 | 51,91 | 186,33 | 80,75 | 29,49 | 175,77 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 103,31 | 79,56 | 131,93 | 111,90 | 82,50 | 148,36 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 112,29 | 75,18 | 161,27 | 93,39 | 54,37 | 149,53 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 92,85 | 54,06 | 148,67 | 106,20 | 58,01 | 178,21 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 102,99 | 79,65 | 131,04 | 117,26 | 87,30 | 154,18 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 95,89 | 68,18 | 131,09 | 97,57 | 64,28 | 141,96 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 79,50 | 50,38 | 119,30 | 102,39 | 63,36 | 156,53 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 89,17 | 17,92 | 260,55 | 125,25 | 25,17 | 365,97 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 107,36 | 65,55 | 165,81 | 101,42 | 53,95 | 173,44 |
| 27 Leucemias | 107,69 | 73,16 | 152,86 | 120,28 | 77,04 | 178,97 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 109,31 | 49,88 | 207,51 | 92,75 | 29,89 | 216,45 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 98,80 | 92,60 | 105,31 | 110,33 | 102,51 | 118,59 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 26,73 | 5,37 | 78,09 | 161,34 | 83,27 | 281,85 |
| 31 Diabetes mellitus | 105,33 | 84,91 | 129,18 | 87,20 | 64,92 | 114,66 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 95,11 | 74,14 | 120,17 | 134,79 | 103,80 | 172,13 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 113,73 | 22,86 | 332,30 | 108,59 | 12,20 | 392,05 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 105,54 | 11,85 | 381,04 | 75,12 | 0,98 | 417,94 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 99,76 | 82,07 | 120,14 | 89,53 | 69,10 | 114,12 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 110,87 | 57,22 | 193,69 | 134,86 | 64,56 | 248,02 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 85,93 | 66,02 | 109,94 | 116,98 | 88,36 | 151,91 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 91,12 | 78,69 | 104,96 | 111,88 | 95,17 | 130,69 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 96,96 | 86,96 | 107,80 | 116,38 | 103,08 | 130,92 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 88,13 | 74,50 | 103,52 | 99,02 | 81,23 | 119,55 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 101,56 | 91,75 | 112,13 | 90,63 | 79,32 | 103,11 |
| 43 Aterosclerosis | 66,84 | 38,91 | 107,02 | 73,46 | 37,92 | 128,34 |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | 84,38 | 66,70 | 105,32 | 95,56 | 72,56 | 123,53 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 101,71 | 85,83 | 119,68 | 80,86 | 63,81 | 101,06 |
| 47 Asma | 107,27 | 51,36 | 197,29 | 62,20 | 16,73 | 159,26 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|----------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 110,87 | 74,24 | 159,23 | 109,92 | 66,15 | 171,66 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 29,51 | 0,39 | 164,19 | 134,06 | 26,94 | 391,70 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 113,20 | 22,75 | 330,74 | 59,13 | 0,77 | 328,99 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 92,36 | 62,30 | 131,86 | 125,08 | 82,41 | 182,00 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 122,17 | 94,67 | 155,15 | 89,12 | 62,07 | 123,95 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 101,15 | 58,89 | 161,97 | 137,84 | 77,09 | 227,36 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 119,20 | 32,07 | 305,18 | 86,30 | 9,69 | 311,58 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 102,83 | 66,53 | 151,80 | 96,63 | 54,04 | 159,39 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 93,30 | 74,20 | 115,81 | 95,62 | 72,03 | 124,47 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 48,50 | 5,45 | 175,11 | 148,26 | 39,89 | 379,57 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 269,19 | 30,23 | 971,92 | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 257,81 | 3,37 | 1.434,41 | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 113,34 | 68,20 | 177,00 | 111,60 | 59,36 | 190,84 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | 177,00 | 2,31 | 984,83 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 86,66 | 9,73 | 312,89 | 126,05 | 14,16 | 455,10 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 45,95 | 22,91 | 82,22 | 183,68 | 122,98 | 263,80 |
| 64 Senilidad | 53,95 | 33,38 | 82,47 | 90,08 | 56,43 | 136,40 |
| 65 Muerte súbita infantil | 255,73 | 28,72 | 923,30 | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 97,01 | 69,29 | 132,10 | 116,67 | 80,30 | 163,86 |
| 67 Caídas accidentales | 109,80 | 68,78 | 166,24 | 88,93 | 45,90 | 155,36 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 94,55 | 62,29 | 137,57 | 74,31 | 40,59 | 124,69 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 111,73 | 59,43 | 191,07 | 128,16 | 61,35 | 235,70 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 95,93 | 68,83 | 130,14 | 91,30 | 60,15 | 132,84 |
| 72 Homicidios | 90,16 | 38,82 | 177,67 | 66,77 | 17,96 | 170,95 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 102,34 | 11,49 | 369,49 | 231,60 | 46,55 | 676,69 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 89,06 | 32,52 | 193,85 | 153,72 | 61,58 | 316,73 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 185,82 | 37,35 | 542,93 | 221,92 | 24,92 | 801,25 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 118,61 | 1,55 | 659,95 | 210,97 | 2,76 | 1.173,82 |
| 4 Septicemia | 91,24 | 48,53 | 156,04 | 89,15 | 35,72 | 183,69 |
| 5 Hepatitis víricas | | | | 165,60 | 18,60 | 597,91 |
| 6 SIDA | 159,24 | 51,32 | 371,62 | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 74,81 | 20,13 | 191,53 | 146,65 | 39,45 | 375,45 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 63,09 | 12,68 | 184,34 | 125,65 | 25,25 | 367,13 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 86,00 | 45,75 | 147,08 | 99,24 | 42,73 | 195,56 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 106,86 | 73,54 | 150,08 | 76,63 | 40,76 | 131,05 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 132,78 | 68,53 | 231,96 | 40,39 | 4,54 | 145,84 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 67,71 | 29,15 | 133,42 | 109,74 | 43,97 | 226,12 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 35,97 | 0,47 | 200,12 | 262,42 | 70,60 | 671,85 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 94,53 | 51,64 | 158,61 | 138,56 | 69,07 | 247,93 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 105,24 | 33,92 | 245,60 | 205,09 | 66,09 | 478,60 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 104,96 | 80,65 | 134,29 | 78,45 | 50,75 | 115,81 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | 309,76 | 34,79 | 1.118,38 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 60,49 | 6,79 | 218,40 | 178,62 | 35,90 | 521,91 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 121,32 | 77,71 | 180,52 | 75,97 | 32,71 | 149,71 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 48,37 | 13,01 | 123,84 | 138,63 | 50,62 | 301,74 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 85,53 | 27,56 | 199,59 | 168,96 | 54,45 | 394,28 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 85,22 | 50,48 | 134,69 | 75,30 | 34,36 | 142,95 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 112,13 | 62,71 | 184,95 | 108,33 | 46,65 | 213,47 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 76,73 | 30,74 | 158,10 | 128,34 | 46,86 | 279,35 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 92,24 | 1,21 | 513,20 | | | |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 147,73 | 67,41 | 280,46 | 58,81 | 6,60 | 212,32 |
| 27 Leucemias | 53,86 | 17,36 | 125,68 | 39,36 | 4,42 | 142,12 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 146,39 | 39,38 | 374,80 | 64,71 | 0,85 | 360,04 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 95,81 | 85,19 | 107,39 | 92,40 | 78,34 | 108,26 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 243,40 | 111,07 | 462,07 | 96,29 | 10,81 | 347,66 |
| 31 Diabetes mellitus | 65,77 | 39,58 | 102,72 | 134,89 | 84,51 | 204,24 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 80,66 | 49,25 | 124,58 | 42,27 | 15,43 | 92,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 881,05 | 11,52 | 4.902,03 | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 171,44 | 2,24 | 953,88 | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 85,82 | 58,69 | 121,16 | 69,97 | 39,13 | 115,41 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 84,98 | 17,08 | 248,30 | 100,95 | 11,34 | 364,48 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 110,62 | 72,88 | 160,96 | 28,74 | 7,73 | 73,59 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 117,01 | 92,92 | 145,44 | 105,99 | 76,05 | 143,80 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 115,77 | 97,00 | 137,12 | 85,01 | 64,03 | 110,65 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 135,39 | 106,67 | 169,46 | 156,50 | 116,15 | 206,33 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 101,39 | 84,71 | 120,40 | 101,93 | 80,03 | 127,96 |
| 43 Aterosclerosis | 152,13 | 80,92 | 260,16 | 61,45 | 12,35 | 179,54 |
| 44 Gripe | 786,25 | 10,28 | 4.374,59 | | | |
| 45 Neumonía | 146,66 | 106,96 | 196,24 | 121,86 | 75,40 | 186,28 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 122,94 | 93,35 | 158,93 | 122,83 | 84,53 | 172,50 |
| 47 Asma | 164,59 | 53,04 | 384,09 | | | |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 69,05 | 25,21 | 150,30 | 101,71 | 32,78 | 237,35 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 90,08 | 1,18 | 501,18 | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 113,98 | 1,49 | 634,16 | 218,24 | 2,85 | 1.214,26 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 74,12 | 31,91 | 146,05 | 82,07 | 26,45 | 191,52 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 110,61 | 66,56 | 172,74 | 68,59 | 25,05 | 149,30 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 88,49 | 28,52 | 206,51 | 153,77 | 49,55 | 358,84 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 92,24 | 1,21 | 513,20 | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 24,44 | 2,74 | 88,22 | 84,78 | 22,81 | 217,05 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 112,69 | 77,55 | 158,26 | 78,44 | 41,73 | 134,15 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 74,02 | 0,97 | 411,81 | 128,26 | 1,68 | 713,64 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 121,81 | 44,48 | 265,15 | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 423,39 | 5,53 | 2.355,67 | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 140,08 | 1,83 | 779,37 | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 113,28 | 51,69 | 215,05 | 202,28 | 92,30 | 384,02 |
| 64 Senilidad | 128,73 | 74,95 | 206,13 | 144,48 | 72,03 | 258,54 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 77,63 | 37,16 | 142,77 | 34,94 | 3,92 | 126,15 |
| 67 Caídas accidentales | 62,11 | 16,71 | 159,03 | 183,20 | 66,90 | 398,77 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 106,40 | 50,94 | 195,68 | 98,51 | 31,75 | 229,90 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 113,31 | 30,48 | 290,10 | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 150,61 | 91,96 | 232,62 | 131,40 | 56,58 | 258,93 |
| 72 Homicidios | 109,94 | 22,10 | 321,23 | 175,90 | 19,76 | 635,10 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | 82,34 | 1,08 | 458,11 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | 111,11 | 12,48 | 401,16 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | 104,69 | 1,37 | 582,46 |
| 4 Septicemia | 58,15 | 11,69 | 169,91 | 111,39 | 65,98 | 176,05 |
| 5 Hepatitis víricas | 117,91 | 1,54 | 656,02 | 144,31 | 38,83 | 369,48 |
| 6 SIDA | 180,64 | 20,29 | 652,21 | 52,37 | 5,88 | 189,08 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 109,09 | 12,25 | 393,87 | 97,77 | 35,70 | 212,80 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 62,38 | 0,82 | 347,09 | 73,06 | 19,66 | 187,06 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 166,65 | 76,04 | 316,37 | 97,89 | 56,99 | 156,74 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 109,21 | 56,36 | 190,78 | 117,02 | 83,96 | 158,75 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 156,63 | 50,47 | 365,51 | 97,55 | 46,70 | 179,40 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 47,89 | 5,38 | 172,91 | 96,71 | 51,45 | 165,40 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 199,53 | 22,41 | 720,41 | 31,55 | 0,41 | 175,57 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 136,09 | 54,52 | 280,41 | 53,24 | 24,30 | 101,08 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 60,71 | 0,79 | 337,79 | 91,33 | 29,43 | 213,12 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 71,31 | 39,88 | 117,63 | 87,32 | 66,63 | 112,40 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 86,05 | 1,12 | 478,75 | 129,58 | 41,76 | 302,41 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 70,71 | 22,79 | 165,00 | 70,27 | 40,14 | 114,12 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 69,20 | 7,77 | 249,84 | 116,01 | 57,83 | 207,60 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 100,14 | 11,25 | 361,55 | 89,48 | 32,67 | 194,76 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 131,18 | 62,80 | 241,27 | 75,86 | 44,93 | 119,89 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 188,06 | 85,81 | 357,02 | 72,81 | 36,30 | 130,29 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 93,69 | 18,83 | 273,75 | 160,97 | 93,72 | 257,74 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | | | | 161,10 | 18,09 | 581,66 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 90,89 | 10,21 | 328,17 | 58,32 | 15,69 | 149,32 |
| 27 Leucemias | 120,96 | 32,54 | 309,69 | 103,89 | 51,79 | 185,90 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | 96,85 | 19,46 | 282,97 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 100,13 | 82,21 | 120,78 | 90,80 | 81,10 | 101,33 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 147,44 | 16,56 | 532,34 | 47,54 | 5,34 | 171,66 |
| 31 Diabetes mellitus | 190,53 | 116,33 | 294,27 | 92,37 | 62,31 | 131,87 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 22,01 | 2,47 | 79,48 | 125,70 | 87,54 | 174,82 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 342,75 | 4,48 | 1.906,98 | 103,30 | 1,35 | 574,75 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | 145,31 | 1,90 | 808,50 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 131,11 | 77,66 | 207,22 | 136,75 | 103,56 | 177,17 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | 50,35 | 5,65 | 181,79 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 167,75 | 93,82 | 276,70 | 112,55 | 76,46 | 159,76 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 95,82 | 61,38 | 142,59 | 85,64 | 66,37 | 108,77 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 86,06 | 60,27 | 119,15 | 76,34 | 62,11 | 92,85 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 82,68 | 48,13 | 132,38 | 78,94 | 58,58 | 104,07 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 107,01 | 79,42 | 141,08 | 107,88 | 91,61 | 126,20 |
| 43 Aterosclerosis | 127,45 | 34,29 | 326,31 | 196,58 | 118,30 | 307,00 |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | 107,56 | 55,51 | 187,90 | 94,84 | 65,27 | 133,20 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 87,32 | 48,84 | 144,04 | 101,90 | 76,55 | 132,97 |
| 47 Asma | 91,31 | 1,19 | 508,02 | 145,48 | 46,88 | 339,50 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 94,47 | 18,99 | 276,02 | 81,83 | 35,23 | 161,25 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 498,35 | 55,97 | 1.799,30 | 157,85 | 17,73 | 569,90 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | 99,37 | 1,30 | 552,87 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 102,24 | 27,51 | 261,75 | 107,14 | 56,99 | 183,22 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 50,25 | 10,10 | 146,82 | 80,04 | 45,72 | 129,99 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | 47,39 | 9,52 | 138,46 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | 161,14 | 18,10 | 581,80 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 231,40 | 92,70 | 476,80 | 129,92 | 67,05 | 226,95 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 102,82 | 51,26 | 183,99 | 124,09 | 89,04 | 168,35 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 198,40 | 2,59 | 1.103,90 | 129,57 | 14,55 | 467,80 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | 83,64 | 26,96 | 195,20 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | 118,68 | 1,55 | 660,34 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 103,74 | 20,85 | 303,12 | 33,39 | 6,71 | 97,55 |
| 64 Senilidad | 205,10 | 98,19 | 377,21 | 153,79 | 97,46 | 230,77 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 197,18 | 89,98 | 374,34 | 91,44 | 49,95 | 153,43 |
| 67 Caídas accidentales | 85,79 | 9,64 | 309,76 | 94,29 | 37,78 | 194,29 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 146,86 | 47,33 | 342,72 | 139,86 | 78,22 | 230,69 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2008 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 773,04 | 10,10 | 4.301,11 | 467,74 | 52,53 | 1.688,76 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | | 69,92 | 14,05 | 204,29 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 151,55 | 60,72 | 312,27 | 57,33 | 26,16 | 108,83 |
| 72 Homicidios | 307,19 | 61,74 | 897,55 | 91,07 | 18,30 | 266,09 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 125,57 | 1,64 | 698,65 | 119,92 | 24,10 | 350,40 |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas