

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD

2024

PRINCIPALES RESULTADOS

Región de Murcia

La tasa bruta de mortalidad por todas las causas de las personas residentes en la Región de Murcia fallecidas en España ha sido de 746,45 fallecimientos por cien mil habitantes, que corresponden a 11.708 defunciones. La tasa de mortalidad masculina ha sido de 778,59 y la femenina de 714,16 por cien mil habitantes (cuadro 1 y *pág. electrónica Región de Murcia* tablas 1, 7, 8 y 9).


Cuadro 1. Mortalidad por grandes grupos de causas y sexo. Región de Murcia. 2024

		Ambos sexos			Hombres			Mujeres		
Grandes grupos de causas		Casos	%	Tasa*	Casos	%	Tasa*	Casos	%	Tasa*
I	Infecciosas y parasitarias	392	3,3	24,99	187	3,1	23,79	205	3,7	26,20
II	Neoplasias	3.131	26,7	199,62	1.906	31,1	242,48	1.225	21,9	156,56
III	Hemato-inmunológicas	66	0,6	4,21	23	0,4	2,93	43	0,8	5,50
IV	Endocrino-metabólicas	452	3,9	28,82	225	3,7	28,62	227	4,1	29,01
V	Trastornos mentales	440	3,8	28,05	153	2,5	19,46	287	5,1	36,68
VI	Sistema nervioso	860	7,3	54,83	347	5,7	44,15	513	9,2	65,56
VII	Ojo y anexos	1	0,0	0,06	1	0,0	0,13	-	-	-
VIII	Oído y apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	Circulatorias	3.276	28,0	208,86	1.629	26,6	207,24	1.647	29,5	210,49
X	Respiratorias	1.196	10,2	76,25	682	11,1	86,76	514	9,2	65,69
XI	Digestivas	574	4,9	36,60	300	4,9	38,17	274	4,9	35,02
XII	Piel	45	0,4	2,87	21	0,3	2,67	24	0,4	3,07
XIII	Osteomusculares	153	1,3	9,75	47	0,8	5,98	106	1,9	13,55
XIV	Genitourinarias	605	5,2	38,57	258	4,2	32,82	347	6,2	44,35
XV	Embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Perinatales	17	0,1	1,08	7	0,1	0,89	10	0,2	1,28
XVII	Malformaciones congénitas	34	0,3	2,17	22	0,4	2,80	12	0,2	1,53
XVIII	Mal definidas	35	0,3	2,23	16	0,3	2,04	19	0,3	2,43
XX	Causas externas	431	3,7	27,48	296	4,8	37,66	135	2,4	17,25
Todas		11.708	100	746,45	6.120	100	778,59	5.588	100	714,16

% sobre el total de cada categoría [no comparables entre sexos]
(*) Tasa bruta por 100.000 habitantes [no comparables entre sexos]

Por su magnitud en ambos sexos, las principales grandes causas de muerte han sido las enfermedades circulatorias (28,0%), seguidas de las neoplasias (26,7%), enfermedades respiratorias (10,2%), afecciones del sistema nervioso (neurológicas) (7,3%), las enfermedades genitourinarias (5,2%), las patologías del aparato digestivo (4,9%), las causas endocrino-metabólicas (3,9%), los trastornos mentales (3,8%) y las causas externas (3,7%) (cuadro y gráfico 1). Los hombres han fallecido por neoplasias (31,1%), enfermedades circulatorias (26,6%), enfermedades respiratorias (11,1%), enfermedades del sistema nervioso (5,7%), enfermedades digestivas (4,9%), causas externas (4,8%), causas genitourinarias (4,2%) y endocrino-metabólicas (3,7%). Por otra parte, las mujeres han fallecido por causas circulatorias (29,5%), neoplasias (21,9%), enfermedades respiratorias (9,2%), afecciones del sistema nervioso (9,2%), enfermedades genitourinarias (6,2%), trastornos mentales (5,1%), del aparato digestivo (4,9%) y causas endocrino-metabólicas (4,1%), (cuadro 1 y *pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).


Gráfico 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. Todas las edades. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



Esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer en la Región de Murcia, para ambos sexos en conjunto, ha sido de 83,32 años (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 18), siendo algo más de cinco años mayor en mujeres que en hombres (85,85 frente a 80,77). En todos los grupos de edad ha sido mayor la esperanza de vida en las mujeres que en los hombres. La distribución de la probabilidad de morir por sexo y edad, se puede observar en el gráfico 2.

Gráfico 2. Probabilidad de morir* por grupo de edad y sexo. Región de Murcia. 2024



(*) Escala logarítmica en base 10

Mortalidad infantil y perinatal

La tasa de mortalidad infantil (fallecimientos en menores del año de edad) en el conjunto de ambos sexos ha sido de 3,36 fallecidos por mil nacidos vivos, que corresponden a 42 muertes entre 12.504 nacidos vivos. Por subgrupos y para ambos sexos, la tasa de la mortalidad neonatal (nacidos vivos fallecidos antes del 28º día cumplido) ha sido de 2,24 por mil nacidos vivos, la tasa de la mortalidad neonatal precoz (nacidos vivos fallecidos antes del 7º día cumplido) ha sido de 1,68 muertes por mil nacidos vivos, la tasa de la mortalidad neonatal tardía (nacidos vivos fallecidos entre el 7º y 27º día de vida, ambos inclusive) 0,56 fallecimientos por mil nacidos vivos, mientras la tasa de la mortalidad postneonatal (fallecidos después del 27º día cumplido y antes de cumplir el año vida) ha registrado 1,12 decesos por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad perinatal en el conjunto de ambos sexos ha sido de 4,78 fallecidos por cada mil nacidos vivos o muertos.

Al comparar entre sexos y tiempo de vida en el momento del fallecimiento, vemos que todas las tasas, en los menores de un año, son mayores en niños que en niñas, salvo la neonatal y la neonatal tardía (pág. electrónica Región de Murcia tablas 6 y 13).


Mortalidad proporcional por grupos de edad

En los gráficos de sectores por grandes grupos de edad, se indica el número de defunciones para informar a que tamaño de efectivos se refieren los porcentajes sobre el subtotal de edad y sexo.

➤ Menores de 1 año

En el conjunto de ambos sexos han predominado, como causa de mortalidad, las afecciones del periodo perinatal (38,1%) y el grupo de las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas (35,7%) (gráfico 3). En cada uno de los sexos por separado, han sido también estos dos grandes grupos los predominantes como causa de mortalidad, aunque en el sexo masculino el orden es diferente, siendo el grupo de malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas el más frecuente como causa de muerte, seguido de las afecciones perinatales (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).


Gráfico 3. Mortalidad proporcional por grandes causas en menores de 1 año. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



➤ De 1 a 14 años

Las grandes causas más frecuentes han presentado niveles bajos, tanto en el total de ambos sexos como en hombres y mujeres. (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).


Gráfico 4. Mortalidad proporcional por grandes causas en población infantil de 1 a 14 años. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



➤ De 15 a 44 años

Las personas de ambos sexos han fallecido, en la edad adulta, por causas externas (32,5%), enfermedades neoplásicas (29,3%), enfermedades circulatorias (16,3%), enfermedades del sistema nervioso (6,0%), causas no clasificadas en otra parte (4,2 %), enfermedades del aparato digestivo (3,9%), y patología respiratorias (3,2%) (gráfico 5). En cuanto a las causas de muerte en hombres y mujeres por separado, en este grupo de edad, han coincidido las tres primeras causas, pero en distinto orden. Así, los varones han expirado por causas externas (39,5%), neoplasias (22,1%), enfermedades circulatorias (16,9%), enfermedades del sistema nervioso (6,7%), enfermedades del sistema respiratorio (3,1%). Las mujeres han fallecido por neoplasias (45,5%), causas externas (17,0%), enfermedades circulatorias (14,8%), digestivas (6,8%), enfermedades del sistema nervioso (4,5%) y del sistema respiratorio (3,4%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).


Gráfico 5. Mortalidad proporcional por grandes causas de 15 a 44 años. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



➤ De 45 a 74 años

Las personas de ambos sexos de este grupo de edad han fenecido por neoplasias (43,7%), enfermedades circulatorias (23,0%), enfermedades respiratorias (6,6%), causas externas (6,3%) y por enfermedades del aparato digestivo (5,7%) (gráfico 6). Los hombres han seguido el mismo orden en las dos primeras causas de muerte: neoplasias (40,6%), circulatorias (25,9%), además de morir por causas externas (6,9%), enfermedades respiratorias (6,8%) y enfermedades digestivas (5,9%). En las mujeres también han coincidido las dos primeras causas: neoplasias (49,9%) y circulatorias (17,5%), además de las enfermedades respiratorias (6,2%), del sistema nervioso (6,0%), digestivas (5,5%) y por causas externas (5,3%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).


Gráfico 6. Mortalidad proporcional por grandes causas de 45 a 74 años. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



➤ De 75 y más años

En los mayores de 74 años, en ambos sexos en conjunto, han predominado las defunciones por enfermedades circulatorias (30,5%), enfermedades neoplásicas (20,1%), respiratorias (11,9%), enfermedades del sistema nervioso (8,5%), genitourinarias (6,7%), trastornos mentales (5,0%), digestivas (4,7%) y endocrino-metabólicas (4,1%) (gráfico 7). Los varones han expirado por enfermedades circulatorias (27,8%), neoplasias (26,5%), enfermedades respiratorias (14,1%), del sistema nervioso (6,7%), afecciones genitourinarias (5,9%), digestivas (4,5%) y endocrino-metabólicas (3,6%) mientras que las mujeres han muerto por enfermedades circulatorias (32,9%), neoplasias (14,7%), enfermedades respiratorias (10,1%), afecciones del sistema nervioso (10,1%), genitourinarias (7,4%) y trastornos mentales (6,2%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 1).

Gráfico 7. Mortalidad proporcional por grandes causas en 75 y más años. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



Cuadro 2. Grandes grupos de causas de muerte* por grupos de edad. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024

	Casos	Tasa**
Menores de 1 año		
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	16	124,50
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	15	116,72
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4	31,13
De 1 a 4 años		
II. Neoplasias	3	5,32
De 5 a 14 años		
II. Neoplasias	5	2,82
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3	1,69
De 15 a 24 años		
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	13	6,84
II. Neoplasias	11	5,79
VI. Enfermedades del sistema nervioso	7	3,68
De 25 a 34 años		
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	30	16,18
II. Neoplasias	14	7,55
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	8	4,32
De 35 a 44 años		
II. Neoplasias	58	25,90
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	49	21,88
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	33	14,74
De 45 a 54 años		
II. Neoplasias	169	66,62
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	88	34,69
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	74	29,17
De 55 a 64 años		
II. Neoplasias	473	227,76
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	239	115,09
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	75	36,11
De 65 a 74 años		
II. Neoplasias	753	547,59
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	408	296,70
X. Enfermedades del sistema respiratorio	130	94,54
De 75 a 84 años		
II. Neoplasias	910	1.061,96
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	769	897,41
X. Enfermedades del sistema respiratorio	317	369,93
De 85 a 94 años		
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	1.393	3.909,63
II. Neoplasias	665	1.866,40
X. Enfermedades del sistema respiratorio	544	1.526,80
De 95 y más años		
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	331	12.462,35
X. Enfermedades del sistema respiratorio	115	4.329,82
II. Neoplasias	69	2.597,89

* No se citan las grandes causas con menos de 3 defunciones

** Tasa específica por cien mil habitantes

Mortalidad por causas seleccionadas

Cuadro 3. Diez primeras causas seleccionadas de mortalidad. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024

Nº y literal de la lista de causas seleccionadas*	Casos	%	Tasa bruta**	Tasa estándar***
40 Enfermedades isquémicas del corazón ^a	833	7,1	53,11	58,07
42 Enfermedades cerebrovasculares	760	6,5	48,45	53,53
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	655	5,6	41,76	46,59
38 Enfermedades hipertensivas	585	5,0	37,30	41,21
36 Enfermedad de Alzheimer	512	4,4	32,64	35,97
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	412	3,5	26,27	28,93
45 Neumonía	324	2,8	20,66	22,72
31 Diabetes mellitus	320	2,7	20,40	22,50
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	316	2,7	20,15	22,34
10 Neoplasia maligna del colon	268	2,3	17,09	18,82
Total defunciones por todas las causas	11.708	100	746,45	817,91

^a Incluye al infarto agudo de miocardio.

* Por comparabilidad nacional se excluyen las neoplasias malignas y el infarto agudo de miocardio.

** Tasa por 100.000 habitantes.

*** Tasa ajustada por edad, método directo a la población europea estándar 2013 y 100.000 habitantes.

Las diez primeras causas seleccionadas de mortalidad según sexo se han ordenado por la magnitud de la tasa bruta. Para el conjunto de ambos sexos, la primera causa seleccionada de muerte ha sido la enfermedad isquémica del corazón (53,11 muertes por cien mil habitantes), enfermedad cerebrovascular (48,45 por cien mil habitantes), el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (41,76 por cien mil), seguidas de las enfermedades hipertensivas (tasa bruta de 37,30 casos por cien mil habitantes), enfermedad de Alzheimer (32,64 por cien mil), los trastornos mentales orgánicos senil y presenil (26,27 por cien mil), la neumonía (20,66 por cien mil), la diabetes mellitus (20,40 por cien mil), las enfermedades de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) (20,15 por cien mil) y el cáncer de colon (17,09 por cien mil habitantes) (cuadro 3).

Cuadro 4. Diez primeras causas seleccionadas de mortalidad. Hombres. Región de Murcia. 2024

Nº y literal de la lista de causas seleccionadas*	Casos	%	Tasa bruta**	Tasa estándar***
40 Enfermedades isquémicas del corazón ^a	554	9,1	70,48	91,98
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	497	8,1	63,23	79,40
42 Enfermedades cerebrovasculares	325	5,3	41,35	56,97
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	237	3,9	30,15	41,30
38 Enfermedades hipertensivas	209	3,4	26,59	39,68
45 Neumonía	179	2,9	22,77	33,21
36 Enfermedad de Alzheimer	165	2,7	20,99	30,05
31 Diabetes mellitus	163	2,7	20,74	27,87
22 Neoplasia maligna de la próstata	162	2,6	20,61	29,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	134	2,2	17,05	26,01
Total defunciones por todas las causas	6.120	100	778,59	1.033,90

^a Incluye al infarto agudo de miocardio.

* Por comparabilidad nacional se excluyen las neoplasias malignas y el infarto agudo de miocardio.

** Tasa por 100.000 habitantes.*** Tasa ajustada por edad, método directo a la población europea estándar 2013 y 100.000 habitantes.

En los hombres, destaca la enfermedad isquémica del corazón (tasa bruta de 70,48 casos por cien mil hombres), seguida del cáncer pulmonar, tráquea y bronquios (63,23 muertes por cien mil hombres), la enfermedad cerebrovascular (41,35 por cien mil), la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) (30,15 por cien mil), enfermedades hipertensivas (26,59 por cien mil), la neumonía (22,77 por cien mil), la enfermedad de Alzheimer (20,99 por cien mil), la diabetes mellitus (20,74 por cien mil), el cáncer de próstata (20,61 por cien mil), y finalmente los trastornos mentales orgánicos senil y presenil (17,05 casos por cien mil) (cuadro 4).

En las mujeres, la mayor tasa bruta se ha observado en la enfermedad cerebrovascular, también denominada ictus (tasa bruta de 55,59 por cien mil), seguida de la enfermedad hipertensiva (48,05 por cien mil), la enfermedad de Alzheimer (44,35 por cien mil), la enfermedad isquémica del corazón (35,66 por cien mil), los trastornos mentales orgánicos senil y presenil (35,53 por cien mil), el cáncer de mama (23,00 por cien mil), el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (20,19 por cien mil), la diabetes mellitus (20,07 por cien mil), la neumonía (18,53 por cien mil) y el cáncer de colon (17,38 por cien mil) (cuadro 5).

Cuadro 5. Diez primeras causas seleccionadas de mortalidad. Mujeres. Región de Murcia. 2024

Nº y literal de la lista de causas seleccionadas*	Casos	%	Tasa bruta**	Tasa estándar***
42 Enfermedades cerebrovasculares ^a	435	7,8	55,59	50,08
38 Enfermedades hipertensivas	376	6,7	48,05	40,99
36 Enfermedad de Alzheimer	347	6,2	44,35	39,36
40 Enfermedades isquémicas del corazón a	279	5,0	35,66	32,17
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	278	5,0	35,53	30,37
19 Neoplasia maligna de la mama	180	3,2	23,00	21,91
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	158	2,8	20,19	20,33
31 Diabetes mellitus	157	2,8	20,07	18,01
45 Neumonía	145	2,6	18,53	16,19
10 Neoplasia maligna del colon	136	2,4	17,38	16,44
Total defunciones por todas las causas	5.588	100	714,16	649,80

^a Incluye al infarto agudo de miocardio.

* Por comparabilidad nacional se excluyen las neoplasias malignas y el infarto agudo de miocardio.

** Tasa por 100.000 habitantes.

*** Tasa ajustada por edad, método directo a la población europea estándar 2013 y 100.000 habitantes.

Al comparar hombres y mujeres por las enfermedades comunes, se ha observado las tasas totales ajustadas por edad (que son las que permiten comparación) tras estandarización directa, empleando la población europea estándar del año 2013; dichas tasas de mortalidad ajustadas por edad han sido mayores en los hombres (tasa de 1.033,90 por cien mil habitantes) que en las mujeres (tasa de 649,80 por cien mil habitantes). Entre las diez primeras causas seleccionadas, los hombres han presentado mayores tasas de defunción que las mujeres en enfermedad isquémica cardíaca (91,98 y 32,17 respectivamente) y cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (79,40 y 20,33), mientras que las mujeres han registrado mayores tasas que los hombres en enfermedad de Alzheimer (39,36 y 30,05, respectivamente) (cuadros 4 y 5).

Años potenciales de vida perdidos

El indicador años potenciales de vida perdidos (APVP) cuantifica la existencia de mortalidad prematura. Los 31.092,5 APVP para todas las causas representan un promedio de 12,25 años menos entre las personas residentes fallecidas con 70 o menos años de edad en la Región de Murcia (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 14). Los hombres representan el 68,07% del total de los APVP y las mujeres el 31,93% restante de la mortalidad precoz.

Las grandes causas que en el conjunto de ambos sexos han restado más años de la vida en muertes precoces han sido las neoplasias (11.750,5 APVP y 37,8% sobre el total de APVP en ambos sexos), las causas circulatorias (6.076,5 APVP y 19,5%), las causas externas (5697 APVP y 18,3%), las enfermedades digestivas (1.663 APVP y 5,4%), las enfermedades del sistema nervioso (1.465,5 y 4,7%) y las respiratorias (1.328,5 APVP y 4,3%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 14).

En cuanto a grandes causas de mortalidad en hombres, la ordenación descendente se ha iniciado también por las neoplasias (6.553,5 APVP y 31,0% del total de APVP en los hombres), seguidas de las causas externas (4.623,5 APVP y 21,8%), las enfermedades circulatorias (4.580 APVP y 21,6%), las del sistema nervioso (1.118 APVP y 5,3%) y las digestivas (1.068,5 APVP y 5,0%). En las mujeres, la primera causa de APVP la ocupa el grupo de las neoplasias (5.197 APVP y 52,3% del total de APVP en las mujeres), y con mucha menor magnitud, el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio (1.496,5 APVP y 15,1%) y las enfermedades digestivas (595 APVP y 6,0%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 14).

Las causas seleccionadas que en ambos sexos han restado más años a la vida, han sido el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (2.294 APVP y 7,4% del total), las enfermedades isquémicas del corazón (2.189,0 APVP y 7,0%), los accidentes de tráfico (1.808,5 APVP y 5,8%) y el suicidio (1.720 APVP y 5,5%), (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 15).

En hombres, las primeras causas seleccionadas de APVP han sido las enfermedades isquémicas del corazón (1.855,5 APVP y 8,8% del total de APVP en hombres), seguidas de accidentes de tráfico (1.538,5 APVP y 7,3%), la neoplasia maligna pulmonar, tráquea y bronquios (1.479,5 APVP y 7,0%), el suicidio (1.192,5 APVP y 5,6%), y el infarto agudo de miocardio (960 APVP y 4,5 %) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 15).

Para las mujeres, las primeras causas seleccionadas generadoras de APVP han sido el cáncer de mama (1.003,5 APVP y 10,1% sobre el total de mujeres), el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (815 APVP y 8,2%), el suicidio (527 APVP y 5,3%) y las enfermedades cerebrovasculares (435 APVP y 4,4%) (*pág. electrónica Región de Murcia* tabla 15).

Esperanza de vida al nacer

Cuadro 6. Esperanza de vida al nacer por Áreas de Salud según sexo. Región de Murcia. 2024

Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
Área	Años	Área	Años	Área	Años
Vega Media del Segura (Área 6)	84,02	Vega Media del Segura (Área 6)	81,38	Noroeste (Área 4)	86,98
Noroeste (Área 4)	83,76	Murcia - Oeste (Área 1)	81,12	Vega Media del Segura (Área 6)	86,59
Murcia - Oeste (Área 1)	83,65	Vega Alta del Segura (Área 9)	81,06	Lorca (Área 3)	86,43
Lorca (Área 3)	83,50	Murcia - Este (Área 7)	81,04	Altiplano (Área 5)	86,42
Altiplano (Área 5)	83,49	Noroeste (Área 4)	80,77	Mar Menor (Área 8)	86,31
Murcia - Este (Área 7)	83,43	Lorca (Área 3)	80,69	Murcia - Oeste (Área 1)	86,15
Mar Menor (Área 8)	83,30	Altiplano (Área 5)	80,69	Murcia - Este (Área 7)	85,63
Vega Alta del Segura (Área 9)	83,19	Mar Menor (Área 8)	80,46	Vega Alta del Segura (Área 9)	85,29
Cartagena (Área 2)	82,24	Cartagena (Área 2)	79,99	Cartagena (Área 2)	84,48
Región	83,32	Región	80,77	Región	85,85

Razones estándar de mortalidad (REM)

Se comentan los indicadores REM con excesos de mortalidad estadísticamente significativos por área de salud, según causa y sexo, en comparación al promedio regional. Los excesos de mortalidad se indican expresados en porcentajes redondeados a un decimal. Así, se ha detectado una significativa mayor mortalidad en REM, estadísticamente significativa, por todas las causas en ambos sexos en el área sanitaria de Cartagena (10,0%), y también en hombre y en mujeres de dicha área (7,4 y 12,8%, respectivamente) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tabla 25).

Murcia - Oeste (Área Sanitaria I)

No se ha presentado sobremortalidad por grandes causas en ambos sexos, tampoco en hombres ni en mujeres; por causas seleccionadas, ha habido sobremortalidad en neoplasias de mama en mujeres (71,0%) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Cartagena (Área Sanitaria II)

Se registra exceso en la mortalidad por grandes grupos en enfermedades infecciosas en el conjunto de ambos sexos (29,6%) y en hombres (38,2%), en neoplasias en ambos sexos y mujeres (9,7% y 16,6%, respectivamente); en trastornos mentales y del comportamiento en ambos sexos (52,9%) y en mujeres (70,0%), por enfermedades digestivas en ambos sexos y en hombres (20,1% y 29,1%, respectivamente) y por enfermedades de la piel en el conjunto de ambos sexos (90,2%, 17 casos) y en mujeres (127,5% y 11 casos). Por causas seleccionadas se ha presentado sobremortalidad en ambos sexos y hombres por Covid-19 (61,5% y 86,1%, respectivamente), por cáncer de pulmón, tráquea y bronquios en ambos sexos (18,2%), por trastornos mentales orgánicos senil y presenil en ambos sexos y en mujeres (55,0 y 70,1%, respectivamente) y por enfermedades hipertensivas en hombres (33,9%) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Lorca (Área Sanitaria III)

Se ha presentado sobremortalidad por grandes causas en las enfermedades del aparato digestivo en hombres (37,9%), y en ambos sexos, hombres y mujeres en enfermedades genitourinarias (47,6%, 44,1% y 50,0%, respectivamente).

Por causas seleccionadas, se ha observado sobremortalidad por diabetes en mujeres (55,1%), arteriosclerosis en hombres (186,0% y 6 casos) y por enfermedades renales en ambos sexos y en mujeres (60,8% y 64,8%, respectivamente) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Noroeste (Área Sanitaria IV)

Se ha presentado sobremortalidad por grandes causas y ambos sexos en las enfermedades del sistema nervioso (32,5%) que también se observa en mujeres (49,4%). En causas seleccionadas, para ambos sexos y mujeres ha existido mayor mortalidad por Alzheimer (48,0% y 63,2%, respectivamente) y por enfermedades del riñón (88,4% y 90,3% respectivamente) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Altiplano (Área Sanitaria V)

No se ha presentado sobremortalidad por grandes causas.

Se presenta sobremortalidad por causas seleccionadas para ambos sexos y hombres en tuberculosis (1.164,7%, 2 casos y 1.653,2, 2 casos, respectivamente) y cáncer de estómago (133,4%, 12 casos y 182,6%, 9 casos, respectivamente) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Vega Media del Segura (Área Sanitaria VI)

No se ha presentado sobremortalidad por grandes causas; por causas seleccionadas en hombres, por enfermedad de Alzheimer (41,0%) y en ambos sexos por neumonía (37,5%) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Murcia - Este (Área Sanitaria VII)

No se ha observado sobremortalidad por grandes causas.

Por causas seleccionadas, han presentado sobremortalidad en ambos sexos la gripe (62,0%) y la osteoporosis (71,0%), ésta también en mujeres (74,8%) y las leucemias en hombres (88,0% 14 casos) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Mar Menor (Área Sanitaria VIII)

No se ha observado sobremortalidad por grandes causas.


En causas seleccionadas, en ambos sexos ha sobresalido exceso de mortalidad por Asma (243,4% y 6 casos); en mujeres, las enfermedades infecciosas intestinales (179,7% y 9 casos) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Vega Alta del Segura (Área Sanitaria IX)

Se ha observado sobremortalidad por grandes causas en enfermedades del sistema respiratorio en ambos sexos (32,3%) y en hombres (44,4%).

Por causas seleccionadas, ha habido sobremortalidad en enfermedades cerebrovasculares en ambos sexos (98,9%) y en mujeres (134,8%); en enfermedades de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) en ambos sexos (93,1%) y hombres (97,1%) y en linfomas Hodgkin en mujeres (1.684,6%) (*pág. electrónica Áreas de Salud* tablas 25-29).

Gráfico 8. Mortalidad general de las áreas de salud comparada con el promedio regional*. Ambos sexos. Región de Murcia. 2024



* $p < 0,05$ y ** $p < 0,01$ bilateral. Indica que el área de salud ha presentado mortalidad general estadísticamente distinta de la región (RME = 100)

La fuente de todos los cuadros y gráficos de este análisis es 'Estadísticas Básicas de Mortalidad 2024'.

[Ir a tablas \(ECONET\)](#)

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia, por la vigilancia y mejora de la información de los boletines estadísticos relacionados con la defunción, y por la colaboración con la recuperación de la información que se viene realizando desde el Registro de Mortalidad de la Consejería de Sanidad.

EQUIPO DE TRABAJO

Dirección y coordinación	Inmaculada Moreno Díaz y CREM
Codificación de causas de muerte	M ^a Carmen Navarro Vera
Informática	CREM
Depuración y normalización de vías	CREM

CITA RECOMENDADA

Moreno Inmaculada, Navarro M^a Carmen, Gómez JH, Chirlaque MD y CREM. Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia en 2024. Murcia: Consejería de Salud y Consejería Economía, Fondos Europeos y Transformación Digital; 2025.

www.murciasalud.es/web/servicio-de-epidemiologia/publicaciones-mortalidad y

http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_mortalidadBasica/sec0.html

Depósito Legal: MU-1292-2011

I.S.S.N.: 1135-027X

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital.
Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3^a planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059

Consejería de Salud.
Dirección General de Salud Pública y Adicciones.
Servicio de Epidemiología.
Ronda de Levante 11. Teléfono: 968362039. Email: epidemiologia@carm.es