

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|--|---|---------|---------|--|---------|---------|
|  | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>01-93. Todas las causas</b>   | 546   | 303     | 243     | 5,99   | 6,44    | 5,50    |
| <b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>   | 427   | 232     | 195     | 4,68   | 4,93    | 4,41    |
| <b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>   | 6   | 5       | 1       | 0,07   | 0,11    | 0,02    |
| <b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>  | 14  | 11      | 3       | 0,15   | 0,23    | 0,07    |
| <b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>  | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>  | 9   | 6       | 3       | 0,10   | 0,13    | 0,07    |
| <b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>   | 4   | 4       | 0       | 0,04   | 0,09    | 0,00    |
| <b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>  | 103   | 46      | 57      | 1,13   | 0,98    | 1,29    |
| <b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>  | 34  | 17      | 17      | 0,37   | 0,36    | 0,39    |
| <b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b> | 21  | 9       | 12      | 0,23   | 0,19    | 0,27    |

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|---|---|---------|---------|--|---------|---------|
|   | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>        | 44  | 19      | 25      | 0,48   | 0,41    | 0,57    |
| <b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>     | 4   | 1       | 3       | 0,04   | 0,02    | 0,07    |
| <b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>                                     | 3   | 1       | 2       | 0,03   | 0,02    | 0,05    |
| <b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b> | 2   | 1       | 1       | 0,02   | 0,02    | 0,02    |
| <b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>                 | 1   | 0       | 1       | 0,01   | 0,00    | 0,02    |
| <b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>                | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>  | 59  | 32      | 27      | 0,65   | 0,68    | 0,61    |
| <b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>   | 5   | 2       | 3       | 0,06   | 0,04    | 0,07    |
| <b>15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>  | 24  | 10      | 14      | 0,26   | 0,21    | 0,32    |
| <b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>   | 30  | 20      | 10      | 0,33   | 0,43    | 0,23    |
| <b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|--|---|---------|---------|--|---------|---------|
|  | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>           | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>         | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>    | 73  | 36      | 37      | 0,80   | 0,77    | 0,84    |
| <b>20. Hipoxia intrauterina</b>  | 23  | 10      | 13      | 0,25   | 0,21    | 0,30    |
| <b>21. Asfixia del nacimiento</b>  | 9   | 5       | 4       | 0,10   | 0,11    | 0,09    |
| <b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>   | 7   | 4       | 3       | 0,08   | 0,09    | 0,07    |
| <b>23. Neumonía congénita</b>  | 2   | 1       | 1       | 0,02   | 0,02    | 0,02    |
| <b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>   | 5   | 1       | 4       | 0,06   | 0,02    | 0,09    |
| <b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b> | 7   | 6       | 1       | 0,08   | 0,13    | 0,02    |
| <b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>                               | 5   | 0       | 5       | 0,06   | 0,00    | 0,11    |
| <b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b> | 8   | 5       | 3       | 0,09   | 0,11    | 0,07    |
| <b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>                      | 7   | 4       | 3       | 0,08   | 0,09    | 0,07    |
| <b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>                                    | 21  | 14      | 7       | 0,23   | 0,30    | 0,16    |
| <b>29. Enfermedades virales congénitas</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>   | 17  | 12      | 5       | 0,19   | 0,26    | 0,11    |
| <b>31. Onfalitis del recién nacido</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|---|---|---------|---------|--|---------|---------|
|   | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>                  | 4   | 2       | 2       | 0,04   | 0,04    | 0,05    |
| <b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>                          | 5   | 5       | 0       | 0,06   | 0,11    | 0,00    |
| <b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>                               | 3   | 3       | 0       | 0,03   | 0,06    | 0,00    |
| <b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>  | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>   | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>            | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>                            | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>     | 5   | 4       | 1       | 0,06   | 0,09    | 0,02    |
| <b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>  | 5   | 4       | 1       | 0,06   | 0,09    | 0,02    |
| <b>40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido</b> | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados</b>                       | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|---|---|---------|---------|--|---------|---------|
|   | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>                                     | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b> | 3   | 2       | 1       | 0,03   | 0,04    | 0,02    |
| <b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>                                  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>   | 3   | 2       | 1       | 0,03   | 0,04    | 0,02    |
| <b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>                                 | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>  | 135   | 76      | 59      | 1,48   | 1,62    | 1,34    |
| <b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>                            | 110   | 67      | 43      | 1,21   | 1,43    | 0,98    |
| <b>50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>  | 15  | 8       | 7       | 0,17   | 0,17    | 0,16    |
| <b>50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>  | 8   | 4       | 4       | 0,09   | 0,09    | 0,09    |
| <b>51. Encefalocele</b>   | 1   | 0       | 1       | 0,01   | 0,00    | 0,02    |
| <b>52. Microcefalia</b>   | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>53. Hidrocéfalo congénito</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>   | 4   | 3       | 1       | 0,04   | 0,06    | 0,02    |
| <b>55. Espina bífida</b>  | 1   | 0       | 1       | 0,01   | 0,00    | 0,02    |

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|--|---|---------|---------|--|---------|---------|
|  | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>                        | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>                                       | 40  | 26      | 14      | 0,44   | 0,55    | 0,32    |
| <b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>       | 6   | 5       | 1       | 0,07   | 0,11    | 0,02    |
| <b>60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas</b>   | 5   | 5       | 0       | 0,06   | 0,11    | 0,00    |
| <b>61. Otras malformaciones congénitas del corazón</b>   | 22  | 12      | 10      | 0,24   | 0,26    | 0,23    |
| <b>62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico</b> | 7   | 4       | 3       | 0,08   | 0,09    | 0,07    |
| <b>63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>                                    | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>                                       | 6   | 2       | 4       | 0,07   | 0,04    | 0,09    |
| <b>64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios</b>                            | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>65. Malformaciones congénitas del pulmón</b>  | 6   | 2       | 4       | 0,07   | 0,04    | 0,09    |
| <b>66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>                                    | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>67. Fisura del paladar y labio leporino</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>                                    | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago</b>                   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|---|---|---------|---------|--|---------|---------|
|   | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>69. Malformaciones congénitas del intestino</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>                                      | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>  | 7   | 7       | 0       | 0,08   | 0,15    | 0,00    |
| <b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>                               | 7   | 7       | 0       | 0,08   | 0,15    | 0,00    |
| <b>73. Enfermedad quística del riñón</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b> | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>                                       | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>                         | 9   | 4       | 5       | 0,10   | 0,09    | 0,11    |
| <b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>                              | 25  | 14      | 11      | 0,28   | 0,30    | 0,25    |
| <b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>  | 8   | 6       | 2       | 0,09   | 0,13    | 0,05    |
| <b>79. Síndrome de Down</b>   | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>80. Síndrome de Edwards</b>  | 4   | 4       | 0       | 0,04   | 0,09    | 0,00    |
| <b>81. Síndrome de Patau</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>   | 3   | 1       | 2       | 0,03   | 0,02    | 0,05    |
| <b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>                            | 8   | 3       | 5       | 0,09   | 0,06    | 0,11    |
| <b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>                           | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 |         |         | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |         |         |
|--|---|---------|---------|--|---------|---------|
|  | TOTAL   | Hombres | Mujeres | TOTAL  | Hombres | Mujeres |
| <b>84. Tumores</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> | 1   | 0       | 1       | 0,01   | 0,00    | 0,02    |
| <b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>87. Ileo meconial</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>88. Muerte súbita del lactante</b>  | 2   | 0       | 2       | 0,02   | 0,00    | 0,05    |
| <b>89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>         | 5   | 3       | 2       | 0,06   | 0,06    | 0,05    |
| <b>XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido</b>   | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>90. Accidentes de transporte</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b>   | 1   | 1       | 0       | 0,01   | 0,02    | 0,00    |
| <b>92. Agresiones (homicidio)</b>  | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| <b>93. Otras causas externas</b>   | 0   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas